CARDIOCORE. 2017;52(Espec Congr):90

Cardiocore

257/64 - SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST... ¿VARÍA CON LA EDAD LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO?

A.A. Rojas Sánchez[1], A.M. García Bellón[2], A.M. González González[3], C. Lara García[4], J.A. Arboleda Sánchez[5] y M. de Mora Martín[6]

[1]Médico Residente de 2º año de Cardiología; [2]FEA Cardiología; [4]Médico Residente de 4º año de Cardiología; [5]FEA Medicina Intensiva; [6]Jefe de Servicio de Cardiología. Hospital Regional Universitario de Málaga. [3]FEA Cardiología. Hospital de Poniente. Algeciras.

Resumen

Introducción y objetivos: Desconocemos si IAM en edad temprana incorpora pronóstico grave a largo plazo.

Material y métodos: Prospectivo y multicéntrico de FRCV en pacientes con SCACEST incluidos en Ariam Andalucía desde 1 enero 2012 al 31 diciembre 2016. Estudio comparativo en pacientes mayores y menores de 45 años. Para la comparación usamos chi cuadrado, nivel de significación 95%.

Resultados: 11.575 pacientes, 10,1% menores de 45 años. Varones menores de 45 años mas fumadores (72% vs 39%, p < 0,001), menos hipertensos (27% vs 54,3%, p > 0,0001) menos diabéticos (7,8% vs 29,1%, p > 0,001). Mujeres < 45 años más fumadoras (62,5% vs 12,6%, p > 0,0001) menos dislipémicas (23,2% vs 46,5%, p < 0,0001).

	< 45 años	> 45 años	p
Hipertensión arterial	294 (25%)	5.454 (52,4%)	< 0,0001
Diabetes mellitus	84 (7,1%)	2.838 (27,3%)	< 0,0001
Dislipemia	421 (35,8%)	4.294 (41,3%)	< 0,0001
Fumador	896 (76,2%)	4.073 (39,2%)	< 0,0001
Obesidad	250 (21,3%)	1.895 (18,2%)	0,012

Conclusiones: El tabaquismo factor de riesgo más relacionado en SCACEST en menores 45 años.

See front matter © 2017 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados