Semergen. 2015;41 (Espec Congr):1078

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

160/1402 - VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCÓCICA EN UNA POBLACIÓN EPOC Y DIABÉTICA

A. de Azaola Arias[a], B. Barrios Núñez[b], J. Iturralde Iriso[c], M. López Miralles[a], S. Llano Pajares[a], A. Sauto Gutiérrez[d], M. Monje de Velasco[e], M. Echevarría Díez[f], E. Muro Torres[g] e Í. Goiri Uriarte[h]

[a]Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zalbalgana. Vitoria-Gasteiz. Álava. [b]Médico de Familia. Centro de Salud Zabalgana. Vitoria-Gasteiz. [c]Médico de Familia. Centro de Salud Casco Viejo. Vitoria-Gasteiz. Álava. [d]Médico de Familia. Urgencias. Hospital Universitario Txagorritxu. Álava. [e]Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Olarizu. Vitoria-Gasteiz. [f]Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sansomendi. Vitoria-Gasteiz. Álava. [g]Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zaramaga. Vitoria. [h]Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Martín. Vitoria.

Resumen

Objetivos: Conocer como ha sido la prevalencia de vacunación antigripal y antineumocócica en nuestra población diabética diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Metodología: Estudio descriptivo transversal. se recogen los datos a través del programa Osabide, de una muestra de pacientes EPOC de 5 centros de salud de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Resultados: La muestra son 135 personas. la edad media es de 71,2 ± 10,14 años el 82,22% son hombres. son fumadores el 27,41%, el 41,48% son exfumadores y el 31,11% no fumadores según se recoge en su historia clínica informatizada. en cuanto a prevalencia de vacunación antigripal, el 84,44% está vacunado, el 11,85% no se ha vacunado y el 3,70% se ha negado a vacunarse. los resultados en prevalencias de vacunación antineumocócica, el 68,89% está vacunado, el 25,93% no se ha vacunado y el 5,19% se ha negado.

Conclusiones: En la campaña de vacunación antigripal, hay una proporción importante de pacientes diabéticos con EPOC vacunados, aunque esta proporción disminuye bastante si nos referimos a la vacunación antineumocócica, y debemos mejorar la prevalencia de vacunados sobre todo en esta vacuna, por los beneficios que pueden adquirir estos pacientes de alto riesgo.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.