Semergen. 2015;41 (Espec Congr):845

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

160/2746 - ¿CÓMO ES EL NIVEL DE DEPENDENCIA EN SUJETOS INSTITUCIONALIZADOS? A PROPÓSITO DE UNA REGIÓN RURAL

L. López-Marín[a], M.D. Burguete Ramos[b], F. Leiva Cepas[c] y J.Á. Fernández García[d]

[a]Graduada en Enfermería. Universidad Católica de Valencia. Enfermera en Centro de Salud Gil y Morte. [b]Enfermera. Licenciada en Antropología. Profesora Universidad Católica de Valencia. [c]Médico Residente de 3er año de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio de Villarrubia. Unidad de Gestión Clínica Occidente. Córdoba. [d]FEA Medicina Familiar. Unidad de Gestión Clínica de Occidente. Consultorio de Villarrubia. Córdoba.

Resumen

Objetivos: El proceso de envejecimiento demográfico incrementa progresivamente el número de personas dependientes, ya que los mayores de 65 años constituyen el 75% de las personas dependientes. Objetivo general: conocer el porcentaje de la muestra que presenta algún deterioro según las escalas de Barthel, Lawton-Brody y Pfeiffer, encontrándose además en riesgo social. Objetivos específicos: Identificar a la población mayor de 65 años. Clasificándola según su grado de dependencia para las ABVD (Índice de Barthel) y para las AIVD (Lawton-Brody). Relacionar el grado de deterioro cognitivo y el nivel de dependencia a las ABVD. Comprobar la asociación: edad y sexo con dependencia.

Metodología: Estudio descriptivo transversal de una muestra (n = 99) de personas mayores de 65 años que acuden a consulta de Atención Primaria en el Consultorio de Villarrubia (Córdoba). Se usaron las escalas: Barthel, Pfeiffer, Lawton-Brody y Escala Sociofamiliar de Gijón. El análisis estadístico se realizó con los programas Microsoft Excel 2010 y SPSS versión 19.0.

Resultados: La edad media fue de 75,45 años y el 61,6% eran mujeres. Se ha detectado un 69,7% de la población con algún grado de dependencia para las ABVD y un 78% para las AIVD. El 29,3% presenta algún grado de deterioro cognitivo y el 55,5% tiene riesgo social.

Conclusiones: Se encuentran resultados similares a los publicados en otros artículos respecto al nivel de dependencia y su mayor prevalencia en mujeres, aunque la dependencia para las AIVD es superior. El estado cognitivo es mejor a lo encontrado por otros autores y existe bajo riesgo social en la muestra.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.