Semergen. 2016;42(Espec Congr 15):3

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

212/1611 - FIBROMIALGIA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

J.Á. Marín Serral[a], M. Giménez Olmos[a], P. Carcelle Beltri[a], S. Renau Solaz[b], A. Uceda Riera[b], S. Murciano Martí[b], A. Riaño Montalvo[b], H. Tarabishi Marín[a], M.J. Sáenz Rodríguez[a] y X.A. Landín Delgado[b]

[a]Médico de Familia; [b]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Deltebre. Tarragona.

Resumen

Objetivos: Estudiar las enfermedades asociadas a fibromialgia en nuestro entorno.

Metodología: Diseño: estudio descriptivo. Ámbito: Atención Primaria. Muestra: todos los pacientes diagnosticados de fibromialgia de 3 cupos de un Centro de Atención Primaria (38).

Resultados: Edad media: 58 años. Sexo: mujer 37 (97,4%). Tabaco: no fumador 24 (72,7%), exfumador 6 (18,2%), fumador 3 (9,1%). Enol: no enol 31 (96,9%), enol no de riesgo 1 (3,1%), enol de riesgo 0. Hipertensión (HTA): 17 (44,7%). Diabetes mellitus (DM): 6 (15,8%). Dislipemia (DL): 26 (70,3%). Obesidad: 18 (48,6%). Hipotiroidismo: 9 (23,7%). Enfermedades autoinmunes: 2 (5,3%). Depresión/ansiedad: 30 (81%). Otras enfermedades mentales: 2 (5,3%). Medicación dolor: 34 (89,5%). Medicación psiquiátrica 32 (86,5%).

Conclusiones: Destaca predominio importante del sexo femenino igual que en la bibliografía previa, un porcentaje elevado de dislipemia y un porcentaje elevado de depresión y/o ansiedad. Este estudio muestra una utilización alta de tratamiento farmacológico del dolor y tratamiento farmacológico psiquiátrico en los pacientes con fibromialgia.

Palabras clave: *Fibromialgia. Atención Primaria.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.