Semergen. 2016;42(Espec Congr 15):7

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

212/3726 - DEPRESIÓN EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS EN POBLACIÓN URBANA

G.D.R. Zambrana Calvi

Médico de Familia. Hospital de Valdepeñas. Ciudad Real.

Resumen

Objetivos: Comparar los grados de depresión entre una población de ancianos institucionalizados y otra de ancianos que viven en su domicilio.

Metodología: Estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 150 ancianos mayores de 70 años de los cuales 44% vivían en su domicilio y 56% se encontraban institucionalizados, todos ellos en la ciudad de Ciudad Real. Se determinó que no estuviesen diagnosticados de algún problema depresivo o de algún tipo de enfermedad psicológica. Se utilizó test de Yesavage. El análisis de los datos se realizó utilizando frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y media con desviación estándar para la variables cuantitativas. Para explorar si había diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de respuesta entre ambos grupos se hizo el test chi cuadrado y se midió la magnitud de la asociación mediante la odds ratio y su intervalo de confianza al 95%.

Resultados: El número de participantes que presentaron riesgo de depresión fue de 92 personas, lo que supone un 61% de toda la población estudiada. 82% de los ancianos institucionalizados presentaron riesgo de depresión, mientras que en los ancianos que vivían en su domicilio se encontró que 38%. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (p = 0,000).

Conclusiones: Los ancianos institucionalizados presentan un factor de riesgo para desarrollar depresión.

Palabras clave: *Anciano institucionalizado. Anciano vive en domicilio.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.