Semergen. 2017;43(Espec Congr 1):22

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

242/4008 - EL PROYECTO IBERICAN TRATA DE IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN RIESGO CARDIOVASCULAR Y RENAL Y UTILIZA UN CUESTIONARIO ABREVIADO DEL DIETARY SCORE (DS) PUBLICADO POR PANAGIOTAKOS EN 2005 PARA EVALUAR LA ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA

J. Fernández Vázquez[a], O. Getino de Castro[b], T. Fernández Villa[c], L. Álvarez Álvare3, C. González Donquiles[c] y F. Martínez[d]

[a]Coordinador de Centros de especialidades. Complejo Asistencial Universitario de León. [b]Enfermera. Universidad de León. [c]Instituto Biomedicina Universidad de León. [d]Médico de Familia. Centro de Salud Mansilla de las Mulas. León.

Resumen

Objetivos: El propósito del presente trabajo es valorar la reproductibilidad de este cuestionario y su correlación con el cuestionario completo del DS.

Metodología: Para este objeto se llevó a cabo una prueba test-retest con el mismo cuestionario abreviado valorándose la reproductibilidad mediante el coeficiente de correlación de Pearson y el grado de acuerdo mediante Kappa simple y ponderado. Para la correlación con el cuestionario completo se llevó a cabo, mediante entrevista dirigida por personal especializado, la cumplimentación de un cuestionario de frecuencia alimentaria estructurado y validado, con 146 ítems a partir del cual se calculó el DS y se comparó con los resultados del DS-abreviado mediante coeficiente de correlación de Pearson y el grado de acuerdo mediante Kappa simple y ponderado. Se incluyeron un total de 142 individuos que cumplimentaron el DS-Abreviado y lo repitieron, en promedio a los 39 días.

Resultados: La puntuación obtenida en el primer test fue de 36,6 ± 0,37 y en el retest de 38,6 ± 0,38 lo que supuso un valor de r de 0,58 y un R2 de 0,29. El grado de concordancia observado entre el test y el retest fue de 0,25 en el modelo simple y del 0,43 con el ponderado. La puntuación obtenida con el DS completo fue de: 36,1 ± 0,33 lo que supuso un valor de r de 0,62 y un R2 de 0,38. Entre el primer test y la puntuación obtenida con el DS completo el grado de acuerdo observado fue de: 0,30 ($p < 0,01$) y de 0,51 ($p < 0,01$) con el índice Kappa ponderado.

Conclusiones: Por todo ello se puede concluir que el DS-abreviado presenta una reproductibilidad moderada y una correlación y grado de acuerdo con el DS completo bueno.

Palabras clave: IBERICAN. Riesgo cardiovascular renal.

1138-3593 / © 2017 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.