Semergen. 2017;43(Espec Congr 1):149

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

242/455 - EVALUACIÓN DE LA BÚSQUEDA OPORTUNISTA DE INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN UN CENTRO DE SALUD

M. Villar del Campo[a], J. del Moral Luque[b], J. Rico Bermejo[c], G. López Arilla[d], M. Morán Arribas[e] y G. Rodríguez Caravaca[f]

[a]Médico de Familia. Centro de Salud Los Cármenes. Madrid. [b]Preventivista. Hospital Universitario de Alcorcón. Madrid. [c]Agente Social. Dirección Salud Pública. Madrid. [d]Trabajador Social. Dirección Salud Pública. Madrid. [e]Técnico de Salud Pública. Dirección Salud Pública. Madrid. [f]Médico de Familia. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.

Resumen

Objetivos: Describir la prevalencia de pacientes con prueba oportunista VIH positiva y las características sociodemográficas de pacientes captados y estudiados en un centro de salud participante en el programa del servicio de prevención y diagnóstico precoz de VIH.

Metodología: Estudio observacional de prevalencia. El ámbito de estudio ha sido un centro de salud participante en un programa de prevención y diagnóstico precoz de VIH. Se han incluido los pacientes captados y estudiados en los años 2015 y 2016. Los pacientes eran reclutados entre diferentes poblaciones de riesgo. Los seleccionaba el personal sanitario de diferentes organizaciones no gubernamentales y de colectivos que trabajan con sujetos de riesgo y se ofertaba a pacientes del centro de salud con criterios de inclusión. Las características de los pacientes y factores de riesgo de describen con distribuciones de frecuencias. Se ha evaluado el número absoluto y porcentaje de pruebas de cribado positivas.

Resultados: El número de consultas ofertadas fue de 677. Se reclutaron 476 sujetos de riesgo (70,3% de la oferta) y acudieron a la consulta 392 (82,4%). La mayoría conocieron el servicio por Internet (22%) o fueron derivados desde las consultas de atención primaria (17%). El porcentaje de extranjeros fue del 63,5%. El número de hombres estudiados fue de 285 (72,7%). El factor de riesgo más frecuente fue el de hombres que tienen sexo con hombres (28%). Se realizaron 368 pruebas rápidas VIH en la consulta del centro de salud. Fueron positivas 6 de las pruebas (1,6%).

Conclusiones: La ocupación de las consultas fue alta y acudió a la cita un número alto de sujetos de riesgo. El perfil de los usuarios más frecuente fue el de hombre extranjero que tiene sexo con hombres y que conoce la consulta por internet.

Palabras clave: Virus de inmunodeficiencia adquirida. Screening. Atención primaria.

1138-3593 / © 2017 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.