Semergen. 2017;43(Espec Congr 1):3301

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

242/4722 - TROMBOSIS VENOSA DE LA VENA CEFÁLICA DEL BRAZO. PATOLOGÍA POTENCIALMENTE MORTAL

S. Barbeito Pagliuca[a], F. Villoslada[a], F. Mendoza Carro[a], Y. Cobos[b], E. Pérez[b] y J. de Benito Herrero[b]

[a]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Medina Urbano. Valladolid. [b]Médico de Familia. Centro de Salud Medina Urbano. Valladolid.

Resumen

Descripción del caso: Hombre de 23 años, sin antecedentes patológicos, que estuvo ingresado hace 6 días por salmonelosis. Acude por dolor, rubor, calor e inflamación en trayecto vascular del brazo derecho, acompañado de limitación para la extensión del mismo, sin mejoría con el uso de aspirina y ácido pentosanopolisulfúrico tópico, niega fiebre u otra sintomatología.

Exploración y pruebas complementarias: Se evidencio inflamación, calor, dolor y rubor con trayecto venoso palpable en territorio de vena cefálica del brazo derecho, sin otros hallazgos patológicos. Se realiza ecografía Doppler de miembro superior derecho que evidencia vena cefálica del brazo y tercio proximal del antebrazo sin flujo con Doppler color con contenido ecogénico, no compresible, compatible con trombosis. Se consulta el caso con Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Se indica tratamiento ambulatorio con bemiparina 10.000 Ud cada 24 horas subcutáneo, media de compresión fuerte para el brazo y AINEs, con posterior control por dicho servicio.

Juicio clínico: Trombosis venosa superficial vena cefálica del brazo derecho.

Diagnóstico diferencial: Infecciones locales de piel.

Comentario final: La TVS presenta una incidencia estimada en población general entre el 3% y el 11%, puede aparecer sobre una vena sana o varicosa. Pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo como el cuello, los brazos y las ingles, pero donde son especialmente frecuentes es en las piernas. La aparición de una trombosis sobre una vena sana se debe a la presencia de una enfermedad subyacente que favorece que la sangre tenga mayor predisposición a coagular y, por tanto, a formar trombos. Por otra parte procesos como cateterización o punciones venosas repetidas se han descrito como causas frecuentes. La TVS es una patología no tan frecuente en extremidades superiores y menos en gente joven. El diagnóstico es clínico y ecográfico. El tratamiento es con heparinas de bajo peso molecular, AINEs y medias de compresión en la extremidad.

Bibliografía

1. Lozano Sa¿nchez FS, González Porras JR, Zarco Castillo J, et al. La trombosis venosa superficial: ¿es una enfermedad benigna? Angiologi¿a. 63(1):25-30.

2. Baker CC, Petersen SR, Sheldon GF. Septic phlebitis: a neglected disease. Am J Surg. 1979;138:97-103.

Palabras clave: Trombosis venosa superficial. Tromboflebitis superficial. Trombosis de vena cefálica del brazo.

1138-3593 / © 2017 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.