

Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



0 - DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE CARDIOTOXICIDAD MEDIANTE VENTRICULOGRAFÍA ISOTÓPICA DE EQUILIBRIO

J. Orozco Cortés¹, I. Casáns Tormo¹, R. Díaz Expósito¹, S. Prado Wohlwend¹, H. Bowles Antelo¹, B. Bermejo de las Heras² y M. Romero Otero¹

¹Servicio de Medicina Nuclear; ²Servicio de Hemato-Oncología. Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Resumen

Objetivo: La ventriculografía isotópica (VI) de equilibrio es el método de determinación de la fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo más reproducible y por ello está especialmente indicado en la valoración de pacientes tratados con fármacos potencialmente cardiotóxicos, en los que hemos evaluado nuestros resultados.

Material y métodos: Se analizaron 1.674 VI de 2010-2012, realizadas en proyección OAI con la mejor separación septal, siempre con la misma gammacámara y determinando la FE mediante el mismo programa de procesado semiautomático. Con FE basal (FEb) ≥ 50%, antes del tratamiento, y considerando cardiotoxicidad una disminución ≥ 10% de su FEb o una FE < 50%, encontramos 85 pacientes (84 mujeres) de 32-88 (58 ± 13) años, 51.7% con ≥ 8 VI, con un total de 724 VI realizadas. Recibieron trastuzumab y/o taxol (n: 33-G1) o trastuzumab, taxol y/o antraciclinas (n: 52-G2). En el seguimiento se valoró la primera FE cardiotóxica (FEpc), la de mayor cardiotoxicidad (FEmc) y la última (FEf), estableciendo tres grupos según la recuperación de FE: completa: 100% respecto a FEb (RC), incompleta (RI): < 100% y con FEf ≥ 50%, no recuperación (NR): FEf < 50%.

Resultado: La FEb media fue 62,1 ± 5,3% (50-76%), siendo ≥ 55% en 80/85 (94,1%) pacientes, la FEpc media: 49,8 ± 4,9% (36-61%), con disminución media: 19,8 ± 6,3% respecto a FEb, encontrando en 49/85 (57%) FE < 50% (31-49%) durante el tratamiento. La FEmc media fue 47,9 ± 5,4% (31-61%), con disminución media: 23,0 ± 8,4% respecto a FEb. En 60 pacientes hubo recuperación (R):RC (6) + RI (54) y NR en 25, encontrando valores superiores en R respecto a NR en FEb (63,2 ± 5,3 vs 59,2 ± 3,9, p: 0,001), FEpc (50,6 ± 7 vs 47,8 ± 4,9, p < 0,02), FEmc (49,7 ± 4,6 vs 43,6 ± 5,0, p < 0,001) y menor disminución respecto a FEb de FEmc (21,3 ± 5,7 vs 27,2 ± 11,8, p: 0,003) y FEf (11,4 ± 6,8 vs 21,9 ± 11,1, p < 0,001). Entre G1 y G2 no hubo DS. En pacientes con FEb ≥ 60% (n: 60) respecto a FEb < 60 (n: 25) fueron mayores FEpc (51,4 ± 4,3 vs 46,0 ± 4,2, p < 0,001) y FEmc (49,2 ± 5,5 vs 44,8 ± 3,9, p: 0,001).

Conclusiones: La valoración de las variaciones de la FE mediante VI durante el tratamiento con fármacos cardiotóxicos detecta disminuciones significativas de la FE en fase subclínica, cuando la interrupción del tratamiento puede hacer posible la recuperación de la FE, siendo imprescindible la determinación basal de FE y utilizar siempre el mismo equipamiento para la obtención y procesado de las imágenes.