Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2015;34(Supl 1):40

Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular

0 - ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 1.855 PACIENTES CON CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIROIDES TRATADOS EN EL PERIODO 1998-2012 EN 11 HOSPITALES DE CATALUÑA

J.M. González González[1], M. Ysamat Marfá[1], A. García Burillo[2] y C. Zafón Llopis[3]

[1]Centro de Tecnología Diagnóstica. CETIR-ERESA. Hospital Universitario Mutua Terrassa. [2]Servicio de Medicina Nuclear; [3]Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.

Resumen

Objetivo: En Catalunya se ha constituido el Consorcio para el Estudio del Cáncer de Tiroides (CECaT) como grupo de trabajo de la Sociedad Catalana de Endocrinología y Nutrición (SCEN). Una de las primeras iniciativas del CECat ha sido realizar un estudio descriptivo y retrospectivo de las características de los pacientes intervenidos de cáncer diferenciado de tiroides (CDT) en el periodo 1998-2012.

Material y métodos: 1. Identificar los centros con bases de datos activas de CDT. 2. Actualizar las bases de datos. 3. Seleccionar las variables a incluir. 4. Unificar las bases de datos. 5. Procesamiento estadístico.

Resultado: N: 1.855 pacientes procedentes de 11 hospitales de Catalunya. Mujeres: 79,25%, hombres: 20,75%. Edad media: 47,7 ± 15,7 años. Histología: papilar (CPT) 89% y folicular (CFT) 11%. Variante: clásica 63%, folicular 25% y otras 12%. Tamaño: 21,5 ± 16 mm (mujeres: 20 ± 14,5, hombres: 26,6 ± 20,3, p = 0,000). Microcarcinomas: 30%. Multifocales: 31%. Invasión: 26%. Tiroiditis: 33%. N1 39,4% (media de ganglios extirpados 12,5 ± 12, media de infiltrados 3,6 ± 5,6). Tratamiento con radioyodo: 84,2% (117,4 ± 35 mCi). Seguimiento: 5,5 ± 3,78 años. Persistencia/recurrencia: 23,8%. Metástasis: 5,78%. Situación actual: Sin evidencia de enfermedad: 78,6%, persistencia/recurrencia: 17,6% y exitus: 3,76%.

Conclusiones: Este proyecto de colaboración ha permitido la descripción de la serie más amplia de CDT de estirpe folicular de nuestro país. Las características de los pacientes son similares a las descritas en otras zonas del mundo. El perfil de paciente de la serie: Mujer, 47 años de edad. CPT variante clásica de 21,5 mm. Tratamiento: tiroidectomía total + ablación 131I. Buen pronóstico: 80% de curación a los 5 años.

See front matter © 2015 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados