




Fig. 1.




Fig. 2.

Paciente de 27 años de edad, sin antecedentes de interés, estudiado por presentar sensación de masa abdominal en el cuadrante superior izquierdo. La exploración resultó normal, excepto por palpación de masa, mal definida, en hipocóndrio-flanco izquierdo. Exploraciones complementarias: analítica, normal, excepto plaquetas ( $101.000 \mu\text{l}$ ) y CA 19.9 (652 U/ml). Radiografía de torax, normal. Radiografía simple de abdomen, masa supramesocólica. Ecografía abdominal, tumoración quística de  $20 \times 16 \text{ cm}$ , de bordes homogéneos y ecos en su interior. Los hallazgos en la tomografía computarizada abdominal fueron similares a los ecográficos (fig. 1). La resonancia magnética (fig. 2) mostró gran masa abdominal. Diagnósticos posibles: quiste esplénico epitelial o quiste de duplicación. Intervención: incisión subcostal izquierda. Tumoración esplénica. Se realiza esplenectomía oncológica. Postoperatorio, sin complicaciones. Alta al sexto día de la intervención. AP: tumoración quística esplénica, cuya pared está constituida por tejido fibroso parcialmente calcificado y revestido por epitelio cuboidal con zonas de epitelio escamoso, indicativo de quiste epitelial.

**Diagnóstico:** Quiste epidermoide esplénico.

F. Javier Ibáñez Aguirre<sup>a</sup>, Juan T. Lejarcegui Achicallende<sup>b</sup>, M. Luz Almendral López<sup>c</sup> y Miguel Echenique Elizondo<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Servicio de Cirugía. Hospital de Zumárraga. Zumárraga. Guipúzcoa. España.

<sup>b</sup>Servicio de Radiología. Hospital de Zumárraga. Zumárraga. Guipúzcoa. España.

<sup>c</sup>Servicio de Gastroenterología. Hospital de Zumárraga. Zumárraga. Guipúzcoa. España.

<sup>d</sup>Departamento de Cirugía. Universidad del País Vasco. San Sebastián. Guipúzcoa. España.