CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia

Cartas científicas

Enfermedad de Castleman unicéntrica pélvica

Castleman's disease of the pelvis

La enfermedad de Castleman (EC) es un desorden linfoproliferativo poco frecuente con dos formas clínicas de presentación bien diferenciadas: la forma unicéntrica, de buen pronóstico, y la forma difusa o multicéntrica, de pronóstico más sombrío. La localización más frecuente en la forma unicéntrica es la mediastínica, hasta en dos tercios de los casos, siendo otras localizaciones diferentes a esta más raras. Presentamos el caso de una paciente joven que debutó con una masa retroperitoneal única con adenopatías locorreregionales asociadas cuyo diagnóstico final tras la exéresis quirúrgica resultó ser de CE unicéntrica.

La paciente es una mujer de 19 años que consultó por algias pélvicas en su hospital de referencia. Se practicó una ecografía abdominal que halló una masa sólida, única de 8 cm localizada en fosa iliaca izquierda, sospechosa de teratoma ovárico. Es intervenida quirúrgicamente objetivándose uno órganos genitales internos normales y una tumoración sólida retroperitoneal, sobre el paquete vascular iliaco izquierdo, íntimamente adherida a él, decidiéndose el cierre de la laparotomía y la derivación a nuestro centro. En nuestro centro, se practicó un examen analítico completo que incluía una bioquímica completa, hemograma y coagulación que fueron normales. Se practicó una TAC torácica, abdominal y pélvica que informó de la presencia de una masa pélvica única en región pélvica con un tamaño de 9 x 7 x 6 cm, con pequeñas calcificaciones lineales difusas y sin infiltración de estructuras vecinas (fig. 1). La lesión estaba ampliamente vascularizada, objetivándose un paso precoz del contraste intravenoso desde su aporte arterial al territorio venoso sistémico. Se practicó una arteriografía que dibujó el aporte vascular arterial de la lesión, formado por ramas procedentes de las arterias iliaca externa e interna, procediéndose a la realización de una embolización arterial de la misma (fig. 2) como paso previo a la extirpación quirúrgica que se realizó asociando una linfadenectomía pélvica del territorio iliaco izquierdo. La paciente fue dada de alta sin incidencias en el 6.º día postoperatorio. El análisis definitivo de la pieza y de los ganglios linfáticos remitidos descartó la naturaleza sarcomatosa de la lesión y confirmó el diagnóstico de CE unicéntrica hialinovascular sin afectación de ninguno de los 19 ganglios remitidos.

La paciente se encuentra libre de enfermedad un año después de la cirugía.

La CE es un desorden linfoproliferativo raro. Fue descrita inicialmente en 1956¹ en localización mediastínica, siendo poco frecuente la afectación fuera del mediastino². Consta de dos formas claramente diferenciadas tanto en la extensión de la enfermedad, como en la histología y el pronóstico de las mismas. La CE unicéntrica es más frecuente en pacientes inmunocompetentes, histológicamente de tipo hialino-vascular y de buen pronóstico. La forma difusa, «EC multicéntrica», de tipo fusocelular, a menudo con afectación de órganos fuera del territorio linfático está asociada con un peor pronóstico y aparece en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos con infección por el virus HHV-8³. Se admite también la forma mixta, con características histológicas y pronósticas intermedias entre las dos anteriores.

La incidencia de la forma multicéntrica en pacientes VIH positivos es baja (2%)⁴. En su etiopatogenia está involucrado el HHV-8⁵, virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, y otros linfomas no Hodgkin de alto grado B. Se acepta que el VHH-8 condiciona un peor pronóstico en la EC, aumentando la carga viral en las exacerbaciones de la enfermedad, secretando grandes cantidades de IL-6 e IL-10 virales⁶.

Mientras que las manifestaciones clínicas de la forma difusa no difieren de otros desórdenes linfoproliferativos⁷, esto es: astenia, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, las formas localizadas de la enfermedad, especialmente las que aparecen fuera del mediastino como en nuestro caso, plantean en ocasiones un diagnóstico diferencial complejo. Así en nuestra paciente, la presencia de una masa en la región pélvica, intensamente vascularizada y con adenopatías locorreregionales asociadas, hizo plantearse el diagnóstico diferencial con otros tipos de neoplasias, fundamentalmente las de naturaleza sarcomatosa. No obstante el diagnóstico histopatológico de la lesión precisa de una extirpación radical de la misma.

Esta EC localizada es más a menudo un desorden linfoproliferativo aislado que afecta a pacientes más jóvenes, sin asociación con el HHV-8, siendo en el 90% de los casos la variante hialinovascular, igual que en nuestra paciente. La mayoría de los pacientes están asintomáticos al diagnóstico,

Figura 1 - TAC pélvico. Obsérvese la presencia de una masa pélvica adyacente a los vasos ilíacos con adenopatía adyacente. Presenta alguna calcificación en su interior y genera un desplazamiento de la vejiga.

Figura 2 - Arteriografía. Mapa vascular arterial iliaco de las ramas que irrigan la lesión (izquierda) y embolización preoperatoria de las mismas (derecha) como estrategia para reducir el sangrado operatorio.

con una edad media de 35 años, sin predominio de género. El 70% de los casos la enfermedad estaba en el tórax (mediastino e hilio pulmonar) siendo la segunda localización más frecuente la abdominopélvica^{8,9}.

En las formas localizadas, se alcanza la curación tras la extirpación completa de la lesión, sin tratamiento adyuvante posterior, como en nuestro caso, no habiéndose descrito recurrencias de la misma. En aquellos pacientes en los que las lesiones no han podido ser resecaadas completamente, el tratamiento con radioterapia a dosis de 30 a 45 Gy puede suponer una alternativa terapéutica con tasas de respuesta

completa de hasta el 40%¹⁰. Es importante el seguimiento de este tipo de pacientes ya que presentan un riesgo elevado de desarrollar un linfoma, aun en los pacientes en los que se consiguió una resección completa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Castleman B, Iverson L, Menéndez VP. Localized mediastinal lymphnode hyperplasia resembling thymoma. *Cancer*. 1956;9:822-30.
2. Zorraquino A, Loureiro C, Echenique-Elizondo M, Méndez J. Retroperitoneal Castleman's disease. *Cir Esp*. 2006;79:259.
3. Du MQ, Liu H, Diss TC, Ye H, Hamoudi RA, Dupin N, et al. Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infects monotypic (IgM lambda) but polyclonal naive B cells in Castleman disease and associated lymphoproliferative disorders. *Blood*. 2001;97:2130-6.
4. Powles T, Stebbing J, Bazeos A, Hatzimichael E, Mandalia S, Nelson M, et al. The role of immune suppression and HHV-8 in the increasing incidence of HIV-associated multicentric Castleman's disease. *Ann Oncol*. 2009;20:775-9.
5. Dupin N, Diss TL, Kellam P, Tulliez M, Du MQ, Sicard D, et al. HHV-8 is associated with a plasmablastic variant of Castleman disease that is linked to HHV-8-positive plasmablastic lymphoma. *Blood*. 2000;95:1406-12.
6. Parravicini C, Corbellino M, Paulli M, Magrini U, Lazzarino M, Moore PS, et al. Expression of a virus-derived cytokine, KSHV vIL-6, in HIV-seronegative Castleman's disease. *Am J Pathol*. 1997;151:1517-22.
7. Martino G, Cariati S, Tintisona O, Veneroso S, De Villa F, Vergine M, et al. Atypical lymphoproliferative disorders: Castleman's disease. Case report and review of the literature. *Tumori*. 2004;90:352-5.
8. Keller AR, Hochholzer L, Castleman B. Hyaline-vascular and plasma-cell types of giant lymph node hyperplasia of the mediastinum and other locations. *Cancer*. 1972;29:670-83.
9. MacDonald SR, Lurain JR, Hoff F, Variakojis D, Fishman DA. Castleman disease presenting as a pelvic mass. *Obstet Gynecol*. 1996;87:875-7.
10. Chronowski GM, Ha CS, Wilder RB, Cabanillas F, Manning J, Cox JD. Treatment of unicentric and multicentric Castleman disease and the role of radiotherapy. *Cancer*. 2001;92:670.

Pedro Antonio Cascales^{a,*}, José Gil^a, Matilde Fuster^b, Francisco Lloret^c y Pascual Parrilla^a

^aServicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España

^bServicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España

^cSección de Radiología Intervencionista, Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: cascalex@yahoo.es (P.A. Cascales).

0009-739X/\$ - see front matter

© 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2011.04.017