

La imagen del mes

Obstrucción masiva del retorno venoso por tumor primario de la vena cava inferior

Massive obstruction of venous return due to a primary inferior vena cava tumour

M. Eugenia Gómez García^{a,*}, Fernando Carbonell Castelló^a, Rafael García Espinosa^a y Belén Viñals Larruga^b

^a Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario La Ribera, Alzira, Valencia, España

^b Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario La Ribera, Alzira, Valencia, España



Figura 1




Figura 2

Paciente de 62 años, estudiado tras episodio sincopal con dolor opresivo que debuta y recurre al practicar deporte.

La TC abdomino-pélvica describe una masa retroperitoneal heterogénea, desde el tercio distal infrarrenal del VCI, con calcificaciones y altamente vascularizada, parcialmente extra y endoluminal, con extensión craneal hasta la aurícula derecha, implantándose en septum e insinuándose a través de tricúspide en VD (figs. 1 y 2).

Asumiendo la obstrucción de dicho vaso y la existencia de colaterales de retorno, y planteado el diagnóstico diferencial entre leiomiomasarcoma y angiosarcoma con trombosis asociada, se practica una cirugía resectiva de VCI en 2 tiempos mediante laparo y esternotomía.

Diagnóstico anatomopatológico: leiomiomasarcoma de alto grado.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mar_eugg@hotmail.com (M.E. Gómez García).

0009-739X/\$ – see front matter © 2012 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2012.02.024>