

La imagen del mes

Pseudoaneurisma de la arteria mamaria interna como complicación de una biopsia selectiva de ganglio centinela



Internal mammary artery pseudoaneurysm as a complication of sentinel node biopsy

Antonio Serafín Valero Liñán *, María Ángeles González Jimenez, Felisa Díaz Gómez y Salvador González-Moncayo García

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital General de Almansa, Albacete, España




Figura 1

Varón de 66 años con antecedente de arritmia cardíaca y en tratamiento con anticoagulante oral que fue intervenido de un carcinoma ductal infiltrante multicéntrico de la mama izquierda, realizándose mastectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela en la cadena mamaria interna (pT2N1M0). A la tercera semana postoperatoria presentó tumoración paraesternal compatible con hematoma posquirúrgico (fig. 1A). Dada la ausencia de mejoría se realizó TC que identificó seroma y pseudoaneurisma de 3 × 3 cm que dependía de la porción media de la arteria mamaria interna izquierda (fig. 1B). Tras tratamiento quimioterápico adyuvante, se procedió a su embolización con resultado satisfactorio.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: aseravl@yahoo.es (A.S. Valero Liñán).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.05.005>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.