



## La imagen del mes

## Duplicidad de vena cava inferior con puente de unión sobre aorta infrarrenal



### Duplication of the inferior vena cava with a bridge over the infrarenal aorta

Gloria María Novo Martínez\*, Marta Ballesteros Pomar, Gonzalo Alonso Argüeso y Andrés Manuel Zorita Calvo

Servicio de Angiología y Cirugía Vascul, Complejo Asistencial Universitario León, Oviedo, España




Figura 1

La duplicidad de la vena cava inferior constituye una anomalía anatómica infrecuente (0,3-3%). Tiene su origen en la regresión anómala de la vena supracardinal izquierda en el primer trimestre de embarazo. El diagnóstico preoperatorio en abordajes de región retroperitoneal minimiza el riesgo de hemorragia (fig. 1).

Caso clínico: varón de 70 años, fumador, con diabetes mellitus. Intervenido de forma programada de aneurisma aórtico abdominal de 5,2 cm mediante incisión xifopúbica, con evisceración de paquete intestinal y apertura de retroperitoneo. Visualización de la vena cava inferior izquierda que cruza anteriormente sobre la aorta infrarrenal. Sección más ligadura de puente de unión entre ambas venas cavas. Disección e injerto aorto-aórtico.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [glori\\_mry@hotmail.com](mailto:glori_mry@hotmail.com) (G.M. Novo Martínez).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.12.007>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.