



Imagen del mes

Pancreatitis enfisematosa de evolución fulminante



Emphysematous pancreatitis. Fulminant course

Eva Alonso Calderón*, Christian Pérez González, Mikel Prieto Calvo
y Teresa Marquina Tobalina

Servicio Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya, España



Figura 1




Figura 2

Varón de 75 años, que presenta dolor abdominal a nivel de epigastrio de 12 h de evolución asociado a elevación de amilasa y lipasa, sin datos clínico-analíticos de gravedad. En la tomografía computarizada se observa edema del páncreas sin necrosis (fig. 1). Ingres en planta con tratamiento conservador. Tras 24 h, presenta fracaso multiorgánico, asociado a peritonismo generalizado por lo que ingresa en la UCI. Se repite TC triple contraste, 30 h después, mostrando pancreatitis enfisematosa difusa sin datos de perforación de viscera hueca (fig. 2). Se decide intervención urgente, confirmando los hallazgos, realizándose colecistectomía, drenaje pancreático, colangiografía transcística (normal) y laparostomía. Evolución tórpida, falleciendo a las 48 h del ingreso.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: eva.alonsocalderon@osakidetza.eus (E. Alonso Calderón).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.12.012>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.