



La imagen del mes

Fascitis necrosante del muslo secundaria a diverticulitis sigmoidea perforada

Thigh Necrotizing Fasciitis Secondary to Perforated Sigmoid Diverticulitis

Jorge Sancho Muriel*, Matteo Frasson, Salvador Pous y Eduardo García-Granero

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España




Figura 1

Mujer de 92 años que es llevada a urgencias por un cuadro de confusión de 4 días de evolución. A la exploración presentaba dolor abdominal difuso, sin peritonismo junto con enfisema subcutáneo en el muslo izquierdo. En la analítica de sangre se evidencia una marcada leucocitosis ($46 \times 10^3/\mu\text{l}$) junto con fallo renal agudo e hiperpotasemia. La tomografía computarizada mostró una diverticulitis aguda con un absceso pélvico (fig. 1 A, punta de flecha), fistulizada al muslo izquierdo originando una fascitis necrotizante a dicho nivel (fig. 1B). La paciente falleció en las horas siguientes a su ingreso como consecuencia de un shock séptico.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jsanchomuriel@hotmail.com (J. Sancho Muriel).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2017.11.004>

0009-739X/© 2017 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.