



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Video de mes

Ampulectomía transduodenal laparoscópica por tumor ampular

Laparoscopic transduodenal ampullectomy for ampullary tumor

Esteban Cugat Andorrà, Eric Herrero Fonollosa*,
 Maria Isabel García Domingo y Judith Camps Lasa

Unidad de Cirugía de Hepatobiliopancreática, Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona, España

Los tumores de la ampula de Vater son poco frecuentes y su tratamiento habitual es la duodenopancreatectomía cefálica (DPC).

En casos seleccionados, lesiones benignas como adenomas o lesiones malignas *in situ*, la resección de la tumoración ampular podría ser una alternativa, debiéndose completar la DPC en función de la anatomía patológica.

Se presenta el caso de una paciente de 78 años diagnosticada a raíz de ictericia de una lesión nodular sólida bien delimitada en papila de Vater. Se realizó una ampulectomía

transduodenal laparoscópica con coledocoscopia. El curso postoperatorio fue correcto. La anatomía patológica definitiva fue compatible con adenoma.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2018.09.012](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2018.09.012)

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: eherrero@mutuaterrassa.cat (E. Herrero Fonollosa).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2018.09.012>

0009-739X/© 2018 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.