




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Video del mes

Resección laparoscópica de paraganglioma funcionante

Laparoscopic resection of a functional paraganglioma

Carlos Rodríguez-Otero Luppi*, Manuel Rodríguez Blanco y Amalia Pelegrina Manzano

Unidad de Cirugía General y Digestiva, Clínica ServiDigest, Barcelona, España




Figura 1

Mujer de 41 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) de mal control, cefalea y sudoración, es diagnosticada de tumoración retroperitoneal compatible con paraganglioma funcionante. Presentaba analítica con elevación de normetanefrinas y tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC) con captación a nivel del retroperitoneo de una masa de 4,5 cm de diámetro, ubicada delante de vena cava inferior y aorta, y postero-inferior al duodeno. Previamente alfabloqueador por tres semanas y betabloqueador preoperatorio, es intervenida mediante abordaje laparoscópico y realizándose una exéresis completa de la lesión. Durante la cirugía presentó crisis de HTA con la manipulación del tumor que remitió una vez extirpado el mismo. La biopsia confirmó la sospecha radiológica y bioquímica: paraganglioma (fig. 1).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: crodriguezoterol@gmail.com (C. Rodríguez-Otero Luppi).
<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.07.004>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2022.07.004](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.07.004).