

VIDEO DEL MES

Mastectomía amplia y reconstrucción inmediata con músculo dorsal ancho por angiosarcoma radioinducido de mama

Wide mastectomy and immediate reconstruction with latiss dorsi muscle for radio-induced angiosarcoma of the breast

Daniel Aparicio López*, Jorge Chóliz Ezquerro, Ernesto Hernando Almudí y Carmen Casamayor Franco

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España




Figura 1

El angiosarcoma radioinducido de mama (< 0,05% de la patología mamaria maligna) afecta a mujeres de edad media con historia de tratamiento radioterápico mamario. Se presenta como lesiones violáceas, con una latencia media de 6 años. El único tratamiento curativo es la cirugía, siendo la mastectomía la técnica más empleada. Presenta un elevado índice de recurrencia (52-94%) al tratarse a menudo de lesiones multifocales, que suele ocurrir en el primer año. A pesar del empleo de tratamientos agresivos, su pronóstico es infausto,

con una supervivencia global entre 10,8 y 33 meses, y una supervivencia a 5 años cercana al 20% (fig. 1).

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2023.01.011](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.01.011).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: dani_93@hotmail.com (D. Aparicio López).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.01.011>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.