



Medicina Paliativa

www.elsevier.es/medicinapaliativa



BIBLIOTECA TELEMÁTICA

Biblioteca telemática. Entrega 45

Telematic Library. Instalment 45

Ana de Santiago

Coordinadora de Biblioteca Telemática (www.sepal.com)

Consulte en nuestra web <http://www.sepal.com/biblioteca/> los siguientes artículos comentados:

Metilfenidato para astenia en pacientes ambulatorios con cáncer de próstata

Roth AJ, Nelson C, Rosenfeld B, Scher H, Slovin S, Morris M, et al. *Methylphenidate for fatigue in ambulatory men with prostate cancer. Cancer.* 2010;116:5102-10.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Lo que los oncólogos creen que han dicho y lo que los pacientes creen que han oído: un análisis de las conversaciones sobre estudios en fase I

Jenkins V, Solis-Tripala I, Langridge C, Catt S, Talbot DC, Fallowfield LJ. *What oncologists believe they said and what patients believe they heard: an analysis of phase I trial discussions. J Clin Oncol.* 2011;29:61-8.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Ensayo clínico comparativo cruzado, doble ciego y con distribución aleatoria con modafinilo para la alteración de la atención y psicomotriz en cáncer avanzado

Lundorff LE, Jonsson BH, Sjogren P. *Modafinil for attentional and psychomotor dysfunction in advanced cancer: a double-blind, randomised, cross-over trial. Palliat Med.* 2009;23:731-8.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Barreras para el desarrollo de los cuidados paliativos en Europa Occidental

Lynch T, Clark D, Centeno C, Rocafort J, De Limma L, Filbert M, et al. *Barriers to the development of palliative care in Western Europe. Palliat Med.* 2010;24:812-9.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos, Badajoz, España.

Mejorar la calidad del sueño en los pacientes con cáncer: beneficios del ejercicio domiciliario

Tang MF, Liou TH, Lin CC. *Improving sleep quality for cancer patients: benefits of home-based exercise intervention. Support Care Cancer.* 2010;18:1329-39.

Comentado por Verónica Romani Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

Factores asociados al estrés psicológico y a la resolución del duelo en las parejas de pacientes fallecidos por cáncer gastrointestinal

Winterling J, Wasteson E, Arving C, Johansson B, Glimelius B, Nordin K. *Factors associated with psychological distress and grief resolution in surviving spouses of patients with advanced gastrointestinal cancer. Support Care Cancer.* 2010;18:1377-84.

Comentado por Verónica Romani Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

Uso clínico de los laxantes en los servicios de cuidados paliativos españoles

Noguera A, Centeno C, Librada S, Nabal M. *Clinical use of oral laxatives in palliative care services in Spain. Support Care Cancer.* 2010;18:1491-94.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

El coste del tratamiento de los enfermos terminales

Simoens S, Kutten B, Keirse E, Berghe PV, Beguin C, Desmedt M, et al. *The costs of treating terminal patients. J Pain Symptom Manage.* 2010;40:436-48.

Comentado por Juan Máximo Molina Linde, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, Sevilla, España.

Solicitud de eutanasia y de cuidados paliativos en Francia

Ferrand E, Rondeau E, Lemaire F, Fischler M. *Request for euthanasia and palliative care in France. Lancet.* 2011;377:467-8.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Antidepresivos para el tratamiento de la depresión en cuidados paliativos. Revisión sistemática y metaanálisis

Rayner L, Price A, Evans A, Valsraj K, Hotopf M, Higginson IJ. *Antidepressants for the treatment of depression in palliative care: systematic review and meta-analysis. Palliat Med.* 2011;25:36-51.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna, Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos, Badajoz, España.

Cuidados paliativos en cáncer: un estudio epidemiológico

Becker G, Hatami I, Xander C, et al. *Palliative cancer care: an epidemiologic study. J Clin Oncol.* 2011;29:646-50.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Declaración de la American Society of Clinical Oncology: hacia una atención individualizada de los pacientes oncológicos avanzados

Peppercorn JM, Smith TJ, Helft PR, et al. *American Society of Clinical Oncology statement: toward individualized care for patients with advanced cancer. J Clin Oncol.* 2011;29:755-60.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Factores asociados a la respuesta a metilfenidato en enfermos oncológicos avanzados

Yennurajalingam S, Palmer JL, Chacko R, Bruera E. *Factors associated with response to methylphenidate in advanced cancer patients. Oncologist.* 2011;16:246-53.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Estudio multicéntrico internacional para validar un sistema de clasificación del dolor en pacientes oncológicos

Fainsinger RL, Nekolaichuk C, Lawlor P, et al. *An international multicentre validation study of a pain classification system for cancer patients. Eur J Cancer.* 2010;46:2896-904.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Ensayo clínico multicéntrico y con distribución aleatoria para comparar cifoplastia con balón y ausencia de tratamiento quirúrgico en fracturas dolorosas por compresión vertebral en enfermos oncológicos

Berenson J, Pflugmacher R, Jarzem P, et al. *Balloon kyphoplasty versus non-surgical fracture management for treatment of painful vertebral body compression fractures in patients with cancer: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Oncol.* 2011;12:225-35.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Desarrollo de unas directrices europeas basadas en la evidencia para el manejo de la depresión en cuidados paliativos

Rayner L, Price A, Hotopf M, Higginson IJ. *The development of evidence-based European guidelines on the management of depression in palliative cancer care. Eur J Cancer.* 2011;47:702-12.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Determinantes del lugar de fallecimiento en pacientes que reciben cuidados paliativos domiciliarios

Masucci L, Guerriere DN, Cheng R, Coyte PC. *Determinants of place of death for recipients of home-based palliative care. J Palliat Care.* 2010;26:279-86.

Comentado por José Javier De-Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España.

Características de los pacientes que fallecen en los primeros 30 días tras el diagnóstico de cáncer de mama o cáncer colorrectal en Escocia entre los años 2003 y 2007

Brewster DH, Clark DI, Stockton DL, Munro AJ, Steele RJ. Characteristics of patients dying within 30 days of diagnosis of breast or colorectal cancer in Scotland, 2003-2007. *Br J Cancer*. 2011;104:60-7.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Muriendo bajo una nube

Hansen D. Dying under a cloud. *J Palliat Care*. 2010;26:303-4.

Comentado por José Javier De-Arriba Méndez, Unidad de Medicina Paliativa, Hospital N. S. Perpetuo Socorro, Albacete, España.

¿Se le puede dar al alta a este paciente? Factores asociados con el fallecimiento en el domicilio en enfermos oncológicos

Alonso-Babarro A, Bruera E, Varela-Cerdeira M, et al. Can this patient be discharged home? Factors associated with at-home death among patients with cancer. *J Clin Oncol*. 2011;29:1159-67.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Evolución del estado general y de la intensidad de los síntomas en los últimos seis meses de vida de los pacientes oncológicos

Seow H, Barbera L, Sutradhar R, et al. Trajectory of performance status and symptom scores for patients with cancer during the last six months of life. *J Clin Oncol*. 2011;29:1151-8.

Comentado por Álvaro Sanz Rubiales, Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Efectividad y tolerabilidad del amidotrizoato para el tratamiento del estreñimiento resistente a laxantes en pacientes con cáncer avanzado

Mercadante S, Ferrera P, Casuccio A. Effectiveness and tolerability of amidotrizoate for the treatment of constipation resistant to laxatives in advanced cancer patients. *J Pain Symptom Manage*. 2011;41:421-5.

Comentado por Ana De Santiago Ruiz, Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid, España.

Planificar estudios multicéntricos fase III en cuidados paliativos: revisión consecutiva de una cohorte para identificar posibles participantes

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

Mujeres mayores, cáncer de mama y soporte social

Yoo GJ, Levine EG, Aviv C, Ewing C, Au A. Older women, breast cancer, and social support. *Support Care Cancer*. 2010;18:1521-30.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

Las intervenciones farmacéuticas facilitan la premedicación para prevenir el estreñimiento y los vómitos inducidos por opioides en pacientes con cáncer

Ishihara M, Iihara H, Okayasu S, Yasuda K, Matsuura K, Suzui M, et al. Pharmaceutical interventions facilitate premedication and prevent opioide-induced constipation and emesis in cancer patients. *Support Care Cancer*. 2010;18:1531-8.

Comentado por Verónica Romaní Costa, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.