



ELSEVIER



CARTA CLÍNICA

Presentación de tuberculosis tiroidea primaria como absceso subagudo de tiroides. A propósito de un caso



Presentation of primary thyroid tuberculosis as a sub-acute thyroid abscess. A case report

La tuberculosis tiroidea es una enfermedad extremadamente rara (0,1-0,4%), incluso en países con alta prevalencia de tuberculosis¹⁻³, que suele afectar a mujeres de mediana edad⁴. Las manifestaciones clínicas extrapulmonares son variadas y difíciles de diagnosticar, siendo una enfermedad infradiagnosticada, en la que los pacientes son diagnosticados en fases avanzadas, aumentando así la morbilidad⁵.

Presentamos a un varón sudamericano de 19 años con antecedente de contacto con familiar con tuberculosis, que ingresa por dolor cervical anterior, edema y odinofagia, sin síndrome febril. Refiere clínica similar el mes anterior y pérdida de peso de 5 kg en 6 meses. En la exploración destaca bocio grado II doloroso, firme y duro, sin adenopatías. La analítica muestra T4 libre y TSH aumentando progresivamente. Los valores de anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, CEA, AFP, calcio y fósforo fueron normales. Con el diagnóstico de tiroiditis se dio de alta con ibuprofeno y dexametasona. El paciente es remitido a Cirugía una semana después con absceso cervical. En la exploración se observa nódulo duro eritematoso en la línea media que asciende con la deglución. En la ecografía se aprecia lóbulo tiroideo derecho aumentado de tamaño, heterogéneo, con áreas líquidas en su interior de bordes imprecisos (fig. 1), así como grandes adenopatías laterales derechas con necrosis en su interior (fig. 2). La PAAF muestra componente inflamatorio agudo y resulta negativa para células malignas, así como el Gram y Ziehl-Neelsen. La radiografía de tórax muestra un infiltrado en el lóbulo superior derecho (similar a radiografía de 2009) que podría ser residual por tuberculosis o debido a enfermedad actual. Se realiza la prueba de la tuberculina (PPD), siendo negativa (anérgica). El diagnóstico inicial es de absceso tiroideo subagudo, y se realiza drenaje percutáneo, obteniéndose material purulento. Se trata con levofloxacino,



Figura 1 Estudio ecográfico en modo B que evidencia un aumento del tamaño tiroideo a expensas de ambos lóbulos, y estructura heterogénea con gran componente quístico-necrótico.

remitiendo progresivamente la clínica y el tamaño de la tiroides en controles sucesivos. El resultado microbiológico mostró *Mycobacterium tuberculosis* (en medio de Lowenstein), y se realizó laringoscopia indirecta para descartar

<http://dx.doi.org/10.1016/j.semmerg.2014.04.001>

1138-3593/© 2014 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.




Figura 2 Ecografía en modo B de adenopatías laterocervicales, con pérdida de la estructura ganglionar y centro necrótico.

como origen una laringitis tuberculosa y/o fistula del seno piriforme, sin encontrarse hallazgos patológicos. Se realizó un Mantoux (PPD), que esta vez fue positivo, y se descartó VIH. Dado el diagnóstico definitivo de tuberculosis tiroidea, inició tratamiento con triple asociación antituberculosa. Al año de seguimiento, el paciente permanece asintomático, con analítica y ecografía tiroidea normales, siendo dado de alta de forma definitiva.

La tuberculosis en la glándula tiroidea es una enfermedad extremadamente infrecuente⁵. El origen más habitual es la diseminación hematogena o linfática en una tuberculosis miliar, en la que la tasa de afectación tiroidea alcanzaría un 14%. La clínica más usual sería comenzar como un nódulo tiroideo común o quístico, siendo menos frecuente el inicio como foco caseoso de tuberculosis (que podría simular un carcinoma)³, absceso frío superficial, bocio multinodular (todos ellos subagudos) o, el menos frecuente, un absceso agudo^{1,6}. El diagnóstico diferencial se realizaría con entidades que originan absceso en la línea media cervical (tuberculosis tiroidea, fistula del seno piriforme⁷ y quiste tirogloso complicado), así como con tiroiditis aguda

y subaguda (si el paciente presenta dolor cervical y fiebre) y carcinoma tiroideo (si únicamente aparece una masa cervical indolora de crecimiento rápido⁶). La función tiroidea suele estar preservada, aunque en fases precoces puede aparecer hipertiroidismo, y en fases avanzadas, hipotiroidismo por destrucción de la glándula. Ante la sospecha de infección por micobacterias se debería realizar radiografía de tórax, test cutáneo de tuberculina, ecografía cervical con una citología por PAAF o un examen histológico de la pieza tras la cirugía (si la PAAF fuera negativa)⁸, y un cultivo de micobacterias que debe incluir las de crecimiento lento. Los hallazgos histológicos característicos incluyen granulomas de células epiteliales con necrosis caseosa central, e infiltración periférica de linfocitos y células gigantes de Langhans típicas y atípicas¹. El tratamiento básico es la terapia médica antituberculosa durante 9 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol o estreptomicina o pirazinamida^{6,9}, monitorizando los niveles séricos de hormona tiroidea antes, durante y después del tratamiento. El papel de la cirugía es limitado, consistente en el drenaje de los abscesos de volumen considerable (que aporta material suficiente para obtener cultivos positivos), evitando así una cirugía más agresiva que conlleve la destrucción total de la glándula tiroidea e hipotiroidismo. La tasa de recurrencia está alrededor del 1%, la mayoría por resistencias contra los fármacos antituberculosos. Así pues, la inusual presentación de tuberculosis tiroidea (de interés en la actualidad debido al rebrote de casos de tuberculosis) supone un reto diagnóstico para el cirujano, y requiere un alto índice de sospecha y una evaluación meticulosa del paciente. Ya que el pronóstico es más satisfactorio con un diagnóstico y tratamiento precoces, la tuberculosis tiroidea debería tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de lesiones cervicales inflamatorias de la línea media, especialmente en pacientes con masa inflamatoria que provengan de comunidades con una alta prevalencia de infección tuberculosa¹⁰.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía

- Peteiro-González D, Cabezas-Agrícola JM, Cameselle-Teijeiro J, Mínguez I, Casanueva F. Tuberculosis tiroidea primaria. Endocrinol Nutr. 2010;57:82-5.

2. Ghosh A, Saha S, Bhattacharya B, Chattopadhyay S. Primary tuberculosis of thyroid gland: A rare case report. *Am J Otolaryngol.* 2007;28:267–70.
3. Silva BP, Amorim EG, Pavin EJ, Martins AS, Matos AS, Zantut-Wittmann DE. Primary thyroid tuberculosis: A rare etiology of hypothyroidism and anterior cervical mass mimicking carcinoma. *Arq Bras Endocrinol Metab.* 2009;53:475–8.
4. Ozekinci S, Mizrak B, Saruhan G, Senturk S. Histopathologic diagnosis of thyroid tuberculosis. *Thyroid.* 2009;19:983–6.
5. Bulbuloglu E, Ciralik H, Okur E, Ozdemir G, Ezberci F, Cetinkaya A. Tuberculosis of the thyroid gland: Review of the literature. *World J Surg.* 2006;30:149–55.
6. Majid U, Islam N. Thyroid tuberculosis: A case series and a review of the literature. *J Thyroid Res.* 2011;2011:359864.
7. Vidyadhar P, Krishnan P. Recurrent acute thyroid swellings because of pyriform sinus fistula. *J Pediatr Surg.* 2008;43:e27–30.
8. Modayil PC, Leslie A, Jacob A. Tuberculosis infection of thyroid gland: A case report. *Case Rep Med.* 2009;2009:416231.
9. Akbulut S, Gomceli I, Cakabai B, Turker A, Sezgin A, Bakir S. Clinical presentation of primary thyroid tuberculosis. *Thyroid.* 2010;20:231–2.
10. Akbulut S, Sogutcu N, Arikanoğlu Z, Bakir S, Ulku A, Yagmur Y. Thyroid tuberculosis in southern Turkey: Is this the resurgence of a stubborn disease? *World J Surg.* 2011;35:1847–52.

Ú. Ponce Villar*, M. Planells Roig, A. Coret Franco,
F. Peiro Monzo y F. Caro Perez

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital
Francesc de Borja, Gandia, Valencia, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ursulapv85@hotmail.com

(Ú. Ponce Villar).