



Reprodução & Climatério

<http://www.sbrh.org.br/revista>



Relato de caso

Gravidez após neoplasia da mama: relato de caso



Ana Codorniz*, Susana Mineiro, Telma Esteves, Ana Costa e Fernando Fernandes

Hospital do Espírito Santo E.P.E., Évora, Portugal

INFORMAÇÕES SOBRE O ARTIGO

Histórico do artigo:

Recebido em 25 de junho de 2016

Aceito em 5 de agosto de 2016

On-line em 25 de novembro de 2016

Palavras-chave:

Gravidez

Mama

Neoplasia

R E S U M O

Nos últimos anos, têm sido observados retardos na maternidade. A maior incidência de câncer durante toda a vida e os percentuais de sobrevivência mais expressivos para doenças oncológicas contribuíram para o surgimento de um número crescente de cânceres detectados durante a gravidez, o que implica a necessidade de um conhecimento mais aprofundado da concepção nessas pacientes. O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais frequentemente detectado durante a gestação. Cerca de 40-50% das sobreviventes do câncer de mama desejam engravidar subsequentemente ao tratamento. Apresentamos o caso de uma primigrávida diagnosticada com câncer de mama, que foi bem-sucedida em sua primeira gestação a termo dois anos após o diagnóstico.

© 2016 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Pregnancy after breast cancer: case report

A B S T R A C T

During last years a delay of motherhood has been noticed. The increased incidence of cancer during lifetime and the increased survival rates of oncological diseases have contributed to a growing number of cancers detected during pregnancy which leads to the need for better knowledge about conception in these patients. Breast cancer is the most frequent type of cancer detected during pregnancy. About 40-50% of breast cancer survivors want a subsequent pregnancy after treatment. We present a case of a primigravida diagnosed with breast cancer that conducted her first full term healthy pregnancy 2 years after diagnosis.

© 2016 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Keywords:

Pregnancy

Breast

Neoplasia

* Autor para correspondência.

E-mail: codorniza@hotmail.com (A. Codorniz).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recli.2016.08.003>

1413-2087/© 2016 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

diagnosticados nessa altura ou no 1º ano após o parto.⁴ Já para mulheres em seguimento por neoplasia mamária, são referidas na literatura taxas de desejo de concepção de 40-50%, embora na prática essa taxa se reduza a 4-7% de mulheres que efetivamente voltam a engravidar.⁵ Essa baixa taxa pode ser explicada por vários fatores, tais como a redução da fertilidade associada aos tratamentos instituídos com efeito gonadotóxico² e o receio e dúvidas ainda muito evidentes de uma importante parte da comunidade médica sobre o impacto de uma gravidez no curso da doença, notadamente em termos de risco de recidiva,⁶ o que se traduz por taxas de interrupção de gravidez após neoplasia de mama de 30%.⁴

É importante ter em consideração que, apesar das limitações dos estudos publicados, eles não só não demonstraram um impacto negativo da gravidez no prognóstico da doença como encontraram uma associação positiva entre gravidez e o prognóstico em longo prazo em termos de sobrevivência,^{2,6,7} embora tal associação deva ser analisada cuidadosamente devido ao efeito *healthy mother*, o qual traduz provavelmente um viés de seleção, já que uma importante parte das mulheres que engravidam após doença oncológica é aquela à partida com melhor prognóstico e que se manteve em remissão sem sinais de recidiva de doença.^{4,7,8} Relativamente ao intervalo de tempo mais seguro para a concepção, embora dependa da duração do tratamento completo, do risco de recidiva, da idade e reserva ovárica da doente,² a maioria dos estudos publicados aconselha os dois anos após o diagnóstico^{2,4,8,9} independentemente dos receptores hormonais. Esse período é o recomendado com base no risco de recidiva ser maior nos dois primeiros anos após diagnóstico e por habitualmente ser suficiente para completar o tratamento e poder permitir a recuperação da função ovárica após exposição a fármacos gonadotóxicos.^{4,6} No caso dos tumores com receptores hormonais positivos a discussão é mais controversa, já que recomendar os dois anos de espera até a concepção implicaria uma suspensão da hormonoterapia mais precoce do que o atualmente recomendado.^{10,11} Contudo, a sugestão de aguardar 5-10 anos para programação de uma gravidez pode resultar em dificuldades acrescidas para nova gravidez; mas essas doentes devem ser sempre informadas dos riscos que podem advir da suspensão precoce da hormonoterapia. Nas mulheres que optem por assumir esse risco, parece ser prudente recomendar pelo menos 2-3 anos de hormonoterapia, a qual deverá ser retomada após o parto.^{2,9} Relativamente aos riscos perinatais em gravidezes após neoplasia da mama, embora o número de trabalhos publicados seja limitado,^{12,13} alguns autores referem taxas ligeiramente superiores de partos pré-termo e baixo peso ao nascer,¹³ o que constitui um fator adicional para que o seguimento em consulta de alto risco dessas gravidezes seja equacionado. É ainda essencial referir que a interrupção da gravidez após carcinoma de mama não demonstrou benefícios em termos de prognóstico e de sobrevivência¹, deve essa decisão ser da

responsabilidade da mulher/casal devidamente esclarecidos e informados de acordo com a sua situação.

Para concluir, a gravidez após doença oncológica é cada vez mais um tema da atualidade. Num momento em que se assiste a uma preocupação crescente com questões relacionadas com a oncofertilidade, é essencial desfazer alguns mitos e saber aconselhar adequadamente essas doentes com base em evidências.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

1. Cardonick E. Pregnancy-associated breast cancer: optimal treatment options. *Int J Wom Health*. 2014;6:935-43.
2. Peccatori F, Azim H Jr, Orecchia R, Hoekstra H, Pavlidis N, Kesic V, et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2013.
3. Margulies A, Salleret L, Zilberman S, Nagarra I, Chopier J, Gligorov J, et al. Grossesse après cancer: pour qui et quand? *Bull Cancer*. 2015;102:463-9.
4. Raphael J, Trudeau M, Chan K. Outcome of patients with pregnancy during or after breast cancer: a review of the recent literature. *Curr Oncol*. 2015;22:8-18.
5. Pedro M, Otero B, Martin B. Fertility preservation and breast cancer: a review. *Ecancer*. 2015;9:1-20.
6. Azim H Jr, Santoro S, Pavlidis N, Gerber S, Kroman N, Azim H, et al. Safety of pregnancy following breast cancer diagnosis: a meta-analysis of 14 studies. *Eur J Cancer*. 2011;47:74-83.
7. Azim H Jr, Kroman N, Paesmans M, Gelber S, Rotmensz N, Meys L, et al. Prognostic impact of pregnancy after breast cancer according to estrogen receptor status: a multicenter retrospective study. *J Clin Oncol*. 2012;31:73-9.
8. Ives A, Saunders C, Bulsara M, Semmens J. Pregnancy after breast cancer: population based study. *BMJ*. 2006;1-5.
9. Matthews M, Hurst B, Marshburn P, Usadi R, Papadakis M, Sarantou T. Cancer, fertility preservation and future pregnancy. A comprehensive review. *Obstet Gynecol Int*. 2012;1-11.
10. Gray R, Rea D, Handley K, Bowden S, Perry P, Earl H, et al. AttoM: longterm effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years in 6953 women with early breast cancer. *J Clin Oncol*. 2013;5:1-89.
11. Davies C, Pan H, Godwin J, Gray R, Arriagada R, Raina V, et al. Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen-receptor positive breast cancer: atlas, a randomised trial. *Lancet*. 2012;381:805-16.
12. Langagergaard V, Gislum M, Skriver M, Norgard B, Lash T, Rothman K, et al. Birth outcome in women with breast cancer. *Br J Cancer*. 2006;94:142-6.
13. Dalberg K, Eriksson J, Holberg L. Birth outcome in women with previously treated breast cancer—a population-based cohort study from Sweden. *PLoS Medicine*. 2006;3:1597-602.