Seminarios de la Fundación Española de Reumatología

www.elsevier.es/semreuma

Revisión

Vasculopatía livedoide

María del Carmen Fernández-Antón Martínez

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 25 de octubre de 2010

Aceptado el 5 de noviembre de 2010

Palabras clave:

Vasculopatía livedoide

Atrofia blanca

Livedo reticularis

Úlceras

Keywords:

Livedoid vasculopathy

Atrophie blanche

Livedo reticularis

Ulceration

R E S U M E N

La vasculopatía livedoide es una enfermedad poco frecuente, caracterizada por ulceración crónica y dolorosa en los miembros inferiores, que tiende a evolucionar a lesiones de atrofia blanca, que no son patognomónicas, sino el resultado de múltiples procesos. Es mucho más frecuente en el género femenino, y en la mayoría de los casos se presenta de forma bilateral en el tercio distal de las extremidades inferiores.

Su diagnóstico no es sencillo, y en muchos casos no se obtiene hasta que el cuadro está ya evolucionado, siendo fundamental la correlación clínico-patológica. La realización de biopsia cutánea de las lesiones colabora en el diagnóstico, pero no posee hallazgos patognomónicos.

Existe un amplio arsenal terapéutico que debe valorarse individualmente en función de cada caso.

© 2010 SER. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Livedoid vasculopathy

A B S T R A C T

Livedoid vasculopathy is a rare disease characterized by chronic, painful ulceration of the lower limbs that tends to progress to white atrophic lesions (atrophie blanche). These lesions are not pathognomonic but are the result of multiple processes. Livedoid vasculopathy is much more common in females, and usually occurs bilaterally in the distal third of the lower extremities.

Diagnosis is not easy and is often not made until the disease has progressed. Consequently clinical and pathological correlation is required to suspect this entity. Biopsy of skin lesions aids diagnosis, but lacks pathognomonic findings. A broad therapeutic arsenal is available, which should be assessed individually according to the characteristics of each patient.

© 2010 SER. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

La vasculopatía livedoide (VL) es una enfermedad crónica y dolorosa localizada en los miembros inferiores, caracterizada por la presencia de máculas o pápulo-placas purpúricas con tendencia a la formación de úlceras irregulares, que evolucionan a cicatrices atróficas de morfología estrellada e hiperpigmentación periférica, clásicamente descritas como atrofia blanca¹⁻⁴.

En la literatura se han utilizado múltiples sinónimos para referirse a este cuadro, como los que se recogen en la *tabla 1*, siendo actualmente el término más ampliamente aceptado el de vasculopatía livedoide⁵⁻⁷.

Desde 1998, gracias a la contribución de Jorizzo⁸, se considera que la VL no es el resultado de otras enfermedades, sino una entidad clínica independiente.

Frecuencia

La VL es una enfermedad poco frecuente. Su prevalencia se estima en torno a 1/100.000 casos por año. Puede ocurrir a cualquier edad, siendo frecuente en mujeres jóvenes, con una relación de 3:1. Se localiza preferentemente en los miembros inferiores, sobre todo en los tobillos y en el dorso de los pies, y en la mayoría de los casos su distribución es bilateral⁹.

Etiología

La VL es una entidad de etiopatogenia desconocida. Se piensa que existe una alteración idiopática oclusiva, no inflamatoria de los vasos sanguíneos de pequeño calibre con daño vascular hialinizante y segmentario¹⁰.

Por lo general, la VL muestra depósitos de fibrina en la pared y el lumen de los vasos afectados. La ausencia de una leucocitoclasia importante, así como de un infiltrado perivascular, sugiere

Correo electrónico: carmenfernandezanton@hotmail.com

Tabla 1
Términos empleados para referirse a la vasculopatía livedoide.

Vasculopatía livedoide
Livedo vasculitis
Vasculitis de atrofia blanca
Vasculitis livedoide
Livedo reticularis con ulceraciones en verano o invierno
Atrofia blanca en placa de Milian
Vasculitis hialinizante segmentaria
Vasculopatía livedoide y úlceras purpúreas dolorosas con patrón reticulado de las extremidades inferiores
Capilaritis alba
PURPLE (painful Purpuric Ulcers with Reticular Patterning of the Lower Extremities)

que se trata de un proceso trombooclusivo más que de una vasculitis¹¹.

El mecanismo subyacente al desarrollo de la VL puede estar relacionado, según Maessen-Visch et al², con el desarrollo de un manguito de fibrina, con captura de los glóbulos blancos y de microtrombos, en relación con un defecto del activador del plasminógeno de las células endoteliales, y una disfunción plaquetaria.

Browse y Burnand¹² postularon la teoría del manguito de fibrina: debido al compromiso venoso crónico, se producirían fugas de fibrinógeno de los capilares. Este fibrinógeno se coagularía para formar una banda de fibrina. Dicho brazalete rodea los vasos capilares y establece una barrera que impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a la piel. Sin embargo, para Maessen-Visch et al los manguitos de fibrina son más un indicio de la microcirculación alterada que un factor etiológico en la insuficiencia venosa crónica, y por lo tanto, esta teoría es de precisión incierta.

Algunos autores, como Papi et al¹³, sugieren que existiría un desorden inmunológico y una expresión de la P-selectina que podría tener un papel importante en el desarrollo de la VL.

Se han realizado varios estudios que asocian la VL con multitud de coagulopatías de carácter protrombótico (la mutación del factor V de Leiden, la deficiencia de la proteína C, y otros estados de hipercoagulabilidad heredados), en particular la hiperhomocisteinemia, que se traduce en un aumento de la coagulabilidad. Los niveles del activador tisular del plasminógeno (tPA) parecen ser menores en los pacientes con VL. El inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1) es un inhibidor importante del sistema fibrinolítico. El genotipo 4G/4G del promotor del PAI-1, en el que el PAI-1 está aumentado, se ha relacionado con la VL¹⁴⁻¹⁹.

Otros estudios han relacionado la disfunción plaquetaria con la VL, encontrando un aumento de la agregación plaquetaria, y un éxito terapéutico con fármacos antiplaquetarios²⁰.

Irani-Hakime et al²¹ aportaron casos de NL en relación con la protrombina G20210A y la heterocigosidad del factor de V (Leiden) y la homocigosidad MTHFR C677T, que implican estados protrombóticos.

En conclusión, la VL parece ser principalmente un cuadro oclusivo en lugar de una condición inflamatoria, por lo que no se corresponde con un auténtico fenómeno de vasculitis.

Las alteraciones fisiopatológicas más relevantes aparecen recogidas en la tabla 2.

Manifestaciones clínicas

Los pacientes con VL presentan úlceras dolorosas de morfología estrellada, a menudo múltiples y agrupadas. Se localizan en las piernas, sobre todo en la región maleolar, siendo con frecuencia bilaterales. Ocasionalmente se asocian a livedo reticularis (LR), lo que es característico, aunque no constante (fig. 1). Algunos pacientes, particularmente aquellos con LR prominentes en torno a las úlceras, pueden desarrollar púrpura retiforme o estrellada. Las lesiones tienden a curar dando lugar a cicatrices

Tabla 2
Alteraciones fisiopatológicas en la vasculopatía livedoide.

Incremento	Deficiencia
Fibrinopéptido A	Proteína C
Actividad plaquetaria	Proteína S
Homocisteína	Liberación del activador tisular de plasminógeno (tPA)
Formación de dímeros de fibrina	
Mutación heterocigótica del factor V de Leiden	
Resistencia a la inactividad de la proteína C

Figura 1. Eritema reticulado de base amarillenta en el tercio distal y una úlcera a nivel del maléolo externo derecho de un centímetro de diámetro.

atróficas blanquecinas con hiperpigmentación y telangiectasias periféricas (fig. 2)²².

Se ha descrito su asociación con el fenómeno de Raynaud, la acrocianosis, las venas varicosas (20-75% de los casos), la lipodermatoesclerosis y la mononeuritis múltiple^{23,24}.

No hay exámenes de laboratorio específicos que permitan hacer un diagnóstico definitivo de la VL, aunque los niveles de P-selectina plaquetaria y trombomodulina endotelial pueden estar elevados. En la tabla 3 se recogen las determinaciones analíticas que pueden resultar útiles.

La evaluación del paciente puede incluir estudios apropiados de imagen para descartar la enfermedad vascular periférica (venosa y arterial). Por ejemplo, los estudios de ecografía-Doppler venosos pueden ser útiles. La microcirculación puede ser estudiada por microscopía capilar, mediciones de oxígeno transcutáneo,

Figura 2. Lesiones residuales cicatriciales, con morfología estrellada, atrofia central e hiperpigmentación periférica, en la cara dorsal de ambos pies.

Tabla 3

Pruebas complementarias de laboratorio que pueden mostrar alteraciones en pacientes con vasculopatía livedoide.

Estudio de hemostasia (TP, TTPA)
Homocisteína sérica
Anticuerpos antinucleares (ANA)
Factor reumatoide (FR)
Complejos antígeno-anticuerpo circulantes
Velocidad de sedimentación globular (VSG)
Concentraciones del complemento (C4)
Crioglobulina y crioprecipitinas
Globulinas
Electroforesis sérica y urinaria de proteínas
Actividad biológica y antígenos de proteína C y S, antitrombina III, factor V de Leiden
Anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico
Viscosidad sanguínea
P-selectina plaquetaria y trombomodulina endotelial

C4: factor 4 del complemento; TP: tiempo de protrombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada.

flujometría láser-Doppler, imágenes de perfusión láser-Doppler y microlinfografía.

La biopsia cutánea es de gran ayuda, y una prueba complementaria esencial ante la sospecha clínica de VL, aunque por sí sola no es diagnóstica²⁵.

Anatomía patológica

La histopatología de la VL no es patognomónica y posee características variables en función del estadio evolutivo de la lesión estudiada. En fases iniciales muestra un infiltrado linfocitario perivascular difuso con un infiltrado intersticial de neutrófilos, fibrina depositada en la pared vascular y trombos de fibrina en la luz de las vénulas de la dermis superior. En etapas intermedias aparece un infiltrado linfocitario perivascular superficial y profundo, con infiltrados de neutrófilos localizados en la dermis superior, depósitos de fibrina en la pared vascular y trombos de fibrina ocluyendo la luz de las vénulas, que predominan en la dermis superior. En esta fase también se observan hematíes extravasados en la dermis superior, edema en la dermis papilar, cambios de espongiosis y balonización, con formación de vesículas intraepidérmicas y necrosis epidérmica. Por último, en estadios tardíos predomina un infiltrado linfocitario perivascular superficial difuso, esclerosis y telangiectasias de la dermis superior, con un adelgazamiento epidérmico marcado (fig. 3).

Figura 3. Histopatología de un caso de vasculopatía livedoide. Se aprecian hematíes extravasados y un discreto infiltrado inflamatorio (linfocitos y neutrófilos) rodeando los vasos de pequeño calibre, con paredes vasculares engrosadas por depósitos eosinófilos de fibrina y vasos trombosados.

Tabla 4

Fármacos más recientemente utilizados en el tratamiento de la vasculopatía livedoide clasificados según su mecanismo de acción.

Mecanismo de acción	Fármacos
Inhibición de la síntesis de prostaglandinas	Ácido acetilsalicílico, dipiridamol
Efecto hemorreológico	Tienopiridinas: clopidogrel
Lisis de trombos	Pentoxifilina o blufomedil
	Minidosis subcutáneas de heparina o enoxiparina; warfarina o acenocumarina
	Antagonistas de la vitamina K (fluindiona)
Fibrinolíticos	Fenformina-etilestrenol, danazol, estreptoquinasa-uroquinasa tópicos en gel
Vasodilatadores	Nifedipino, ácido nicotínico o cilostazol
Modulación de la respuesta linfocitaria local	Fototerapia con ultravioleta A asociada a psoralenos orales (PUVA)
Anabolizantes	Danazol
De rescate (formas graves o recalcitrantes)	Inmunoglobulina intravenosa (i.v.), en bolos para pulsoterapia; iloprost i.v.; activador del plasminógeno tisular (tPA); oxígeno hiperbárico

La inmunofluorescencia directa puede revelar la presencia de depósitos de inmunoglobulinas y componentes del complemento en los vasos de la dermis tanto superficial y media como profunda^{26,27}.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la VL es amplio y debe plantearse con multitud de entidades.

Por las lesiones residuales que produce puede incluirse dentro del grupo de cuadros que cursan con atrofia blanca. Esta alteración, descrita por Milian en 1929, no es específica de la VL y puede deberse a multitud de procesos (síndrome antifosfolípido, vasculitis de pequeño vaso, úlceras por hidroxiquina, úlceras asociadas a insuficiencia venosa crónica, lupus, artritis reumatoide o síndrome de Klinefelter).

Otras muchas entidades pueden presentar LR. El síndrome de Sneddon's se caracteriza por la asociación de LR con accidentes cerebrovasculares y afecta por lo general a mujeres jóvenes con LR o livedo racemosa, hipertensión y síntomas neurológicos recurrentes. La panarteritis nudosa (PAN) es una vasculitis segmentaria que afecta fundamentalmente a las arterias de mediano calibre. Tanto la variante cutánea como la sistémica pueden presentar LR, úlceras y nódulos subcutáneos. La PAN sistémica cursa además con fiebre, artralgias, mialgias, parestesias, dolor abdominal, orquitis e hipertensión renovascular. La calciflaxia consiste en el depósito de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos y es más frecuente en el contexto de la insuficiencia renal crónica complicada por hiperparatiroidismo. En un principio, puede iniciarse como LR que posteriormente se convierte en púrpura y necrosis.

Otros cuadros que pueden presentar úlceras similares a las de la VL: las que aparecen en la colagenosis y en la insuficiencia arterial, y las postraumáticas¹⁻⁸.

Tratamiento

Desde el punto de vista terapéutico es importante el control analgésico adecuado, para lo que son útiles los antiinflamatorios no esteroideos y los parches de lidocaína, así como las curas locales de las lesiones ulcerosas mediante recubrimiento y oclusión con apósitos hidrocoloides y el tratamiento de la posible sobreinfección, recomendándose la realización de cultivo y antibiograma, pautando antibioterapia tópica o sistémica, según se precise.

Clásicamente, se han utilizado como tratamiento de elección los corticoides sistémicos y otros inmunosupresores, como la azatioprina y el metotrexato, pero los recientes indicios de la probable relación del cuadro con un fenómeno de hipercoagulabilidad han orientado la terapéutica en este sentido. Por ello los antiagregantes y anticoagulantes están siendo utilizados con éxito en la actualidad, con multitud de casos comunicados de buena respuesta²⁶⁻⁴³.

Recientemente se ha comunicado la efectividad del rituximab en algún caso aislado de VL⁴⁴.

En la tabla 4 se muestran los principales fármacos utilizados y sus mecanismos de acción.

Pronóstico

En general la VL es una enfermedad crónica, aunque está descrita la resolución espontánea o con tratamiento de las lesiones. Aunque se asocia a una morbilidad destacable, sobre todo en relación con el dolor localizado que se produce en las lesiones ulcerosas, la VL no se ha asociado a un incremento significativo de la mortalidad.

Conflicto de intereses

Los autores comunican no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Milstone LM, Braverman IM, Lucky P, Fleckman P. Classification and therapy of atrophie blanche. Arch Dermatol. 1983;119:963-9.
- Maessen-Visch MB, Koedam MI, Hamulyák K, Neumann HAM. Atrophie blanche. Int J Dermatol. 1999;38:161-72.
- Milian MG. Les atrophies cutanées syphilitiques. Bull Soc Franc Derm Syph. 1929;36:865-71.
- Schroeter AL, Díaz-Pérez JL, Winkelmann RK, Jordan RE. Livedo vasculitis (the vasculitis of atrophie blanche). Arch Dermatol. 1975;111:188-93.
- Feldaker M, Hines Jr EA, Kierland RR. Livedo reticularis with summer ulcerations. AMA Arch Derm. 1955;72:31-42.
- Bard JW, Winkelmann RK. Livedo vasculitis. Segmental hyalinizing vasculitis of the dermis. Arch Dermatol. 1967;96:489-99.
- Steanovic DV. Atrophie blanche. A Sign of dermal blood occlusion. Arch Dermatol. 1974;109:858-62.
- Jorizzo JL. Livedoid vasculopathy: what is it? Arch Dermatol. 1998;134:491-3.
- Fernández-Antón MC, Cano N, Avilés JA, Suárez R, Lecona M, Lázaro P. Vasculopatía livedoide. Piel. 2010;25:187-93.
- McCalmont CS, McCalmont TH, Jorizzo JL, White WL, Leshin B, Rothberger H. Livedo vasculitis: vasculitis or thrombotic vasculopathy? Clin Exp Dermatol. 1992;17:4-8.
- Hairston BR, Davis MD, Pittelkow MR, Ahmed I. Livedoid vasculopathy: further evidence for procoagulant pathogenesis. Arch Dermatol. 2006;142:1413-8.
- Browse NL, Burnand KG. The cause of venous ulceration. Lancet. 1982;2:243-5.
- Papi M, Didona B, De Pita O, Frezzolini A, Di Giulio S, De Matteis W, et al. Livedo vasculopathy vs small vessel cutaneous vasculitis: cytokine and platelet P-selectin studies. Arch Dermatol. 1998;134:447-52.
- Baccard M, Vignon-Pennamen MD, Janier M, Scrobohaci ML, Dubertret L. Livedo vasculitis with protein C system deficiency. Arch Dermatol. 1992;128:1410-1.
- Meiss F, Marsch WC, Fischer M. Livedoid vasculopathy. The role of hyperhomocysteinemia and its simple therapeutic consequences. Eur J Dermatol. 2006;16:159-62.
- Pizzo SV, Murray JC, Gonias SL. Atrophie blanche. A disorder associated with defective release of tissue plasminogen activator. Arch Pathol Lab Med. 1986;110:517-9.
- Klein KL, Pittelkow MR. Tissue plasminogen activator for treatment of livedoid vasculitis. Mayo Clin Proc. 1992;67:923-33.
- Deng A, Gocke CD, Hess J. Livedoid vasculopathy associated with plasminogen activator inhibitor-1 promoter homozygosity (4G/4G) treated successfully with tissue plasminogen activator. Arch Dermatol. 2006;142:1466-9.
- Anavekar NS, Kelly R. Heterozygous prothrombin gene mutation associated with livedoid vasculopathy. Australas J Dermatol. 2007;48:120-3.
- Drucker CR, Duncan WC. Antiplatelet therapy in atrophie blanche and livedo vasculitis. J Am Acad Dermatol. 1982;7:359-63.
- Irani-Hakime NA, Stephan F, Kreidry R, Jureidini I, Almawi WY. Livedoid vasculopathy associated with combined prothrombin G20210A and factor V (Leiden) heterozygosity and MTHFR C677T homozygosity. J Thromb Thrombolysis. 2008;26:31-4.
- Toth C, Trotter M, Clark A, Zochodne D. Mononeuropathy multiplex in association with livedoid vasculitis. Muscle Nerve. 2003;28:634-9.
- Verma R, Hadid TH, Dhamija R, Moad JC, Loehrke ME. Livedoid vasculopathy in a woman with multiple myeloma. South Med J. 2010;103:848-9.
- Vowden K. Lipodermatosclerosis and atrophie blanche. J Wound Care. 1998;7:441-3.
- Callen JP. Livedoid vasculopathy: what it is and how the patient should be evaluated and treated. Arch Dermatol. 2006;142:1481-2.
- Ackerman AB, Chongchitnant N, Sanchez J. Histologic diagnosis of inflammatory skin diseases: An algorithmic method based on pattern analysis. 2.a.ed. Baltimore, Md: Williams & Wilkins; 1997.
- Schroeter AL, Díaz-Pérez JL, Winkelmann RK, Jordan RE. Livedo vasculitis (the vasculitis of atrophie blanche). Immunohistopathologic study. Arch Dermatol. 1975;111:188-93.
- Sams Jr WM. Livedo vasculitis. Therapy with pentoxifylline. Arch Dermatol. 1988;124:684-7.
- Hairston BR, Davis MD, Gibson LE, Drage LA. Treatment of livedoid vasculopathy with low-molecular-weight heparin: report of 2 cases. Arch Dermatol. 2003;139:987-90.
- Yang CH, Ho HC, Chan YS, Liou LB, Hong HS, Yang LC. Intractable livedoid vasculopathy successfully treated with hyperbaric oxygen. Br J Dermatol. 2003;149:647-52.
- Juan WH, Chan YS, Lee JC, Yang LC, Hong HS, Yang CH. Livedoid vasculopathy: long-term follow-up results following hyperbaric oxygen therapy. Br J Dermatol. 2006;154:251-5.
- Kern AB. Atrophie blanche. Report of two patients treated with aspirin and dipyridamole. J Am Acad Dermatol. 1982;6:1048-53.
- Purcell SM, Hayes TJ. Nifedipine treatment of idiopathic atrophie blanche. J Am Acad Dermatol. 1986;14(5 Pt 1):851-4.
- Amital H, Levy Y, Shoenfeld Y. Use of intravenous immunoglobulin in livedo vasculitis. Clin Exp Rheumatol. 2000;18:404-6.
- Browning CE, Callen JP. Warfarin therapy for livedoid vasculopathy associated with cryofibrinogenemia and hyperhomocysteinemia. Arch Dermatol. 2006;142:75-8.
- Kavala M, Kocaturk E, Zindanci I, Turkoglu Z, Altintas S. A case of livedoid vasculopathy associated with factor V Leiden mutation: successful treatment with oral warfarin. J Dermatolog Treat. 2008;19:121-3.
- Davis MD, Wysokinski WE. Ulcerations caused by livedoid vasculopathy associated with a prothrombotic state: Response to warfarin. J Am Acad Dermatol. 2008;58:512-5.
- Heine KG, Davis GW. Idiopathic atrophie blanche: treatment with low-dose heparin. Arch Dermatol. 1986;122:855-6.
- Bisalbutra P, Kullavanijaya P. Sulfasalazine in atrophie blanche. J Am Acad Dermatol. 1993;28(2 Pt 1):275-6.
- Bollinger A. White atrophy: skin infarction of various pathogenesis? Vasa. 1981;10:67-9.
- Bollinger A, Leu AJ. Evidence for microvascular thrombosis obtained by intravital fluorescence videomicroscopy. Vasa. 1991;20:252-5.
- Bugatti L, Filosa G, Nicolini M, Filosa A, Verdolini R. Atrophie blanche associated with interferon-alfa adjuvant therapy for melanoma: a cutaneous side effect related to the procoagulant activity of interferon? Dermatology. 2002;204:154.
- Frances C, Barete S. Difficult management of livedoid vasculopathy. Arch Dermatol. 2004;140:1011.
- Zeni P, Finger E, Scheinberg MA. Successful use of rituximab in a patient with recalcitrant livedoid vasculopathy. Ann Rheum Dis. 2008;67:16.