



La imagen del mes

Hidatidosis hepática fistulizada a piel



Hepatic hydatid disease fistulized to the skin surface

Marta Cañón Lara^a, María Fidalgo García^{a,*}, Marcos Gómez Ruiz^a
y Manuel Gómez Fleitas^{a,b}

^aServicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

^bUniversidad de Cantabria, Santander, España



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Varón de 70 años con antecedente de hidatidosis duodenal intervenida hace 30 años, que consulta por tumoración dolorosa en cicatriz de laparotomía. Durante una cura se abre espontáneamente y supura material seroso e hidátides. Una ecografía y una TC abdominal revelan una colección de contenido hipodenso en segmento hepático V, fistulizada a piel (figs. 1 y 2). Se explora quirúrgicamente la herida y se coloca drenaje multiperforado (fig. 3, flechas: hidátides). Se administra albendazol y se realizan lavados con suero salino hipertónico durante 2 semanas hasta la resolución clínico-radiológica del cuadro. El estudio microbiológico fue negativo y la anatomía patológica confirmó el diagnóstico de hidatidosis.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mafidalgo@humv.es (M. Fidalgo García).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.11.006>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.