Neurology Perspectives. 2022;2(Espec Cong 1):12

Neurology perspectives



18384 - GALCANEZUMAB ES UN TRATAMIENTO EFECTIVO EN PACIENTES CON MIGRAÑA CRÓNICA Y FIBROMIALGIA

Zunzunegui Arroyo, P.[1]; Álvarez Escudero, R.[1]; Riesco Pérez, N.P.[1]; González Fernández, L.[1]; Fabregat Fabra, N.[2]; Fernández Fernández, S.[2]; Obach Baurier, V.[2]; Cuadrado, E.[3]; Guisado, D.[3]; Moreira, A.[3]; Suarez Pérez, A.[3]; Aranceta, S.[4]; Guerrero, A.[5]; García-Azorín, D.[5]; Velasco Juanes, F.[6]; Ruisánchez Nieva, A.[7]; García Moncó, J.C.[8]; Roncero, N.[8]; Mínguez-Olaondo, A.[9]; Ruibal Salgado, M.[9]; Kortazar Zubizarreta, I.[10]; Echevarría Urabayen, A.[10]; Martín Bujanda, M.[11]; López Bravo, A.[12]; Oterino Durán, A.[1]

[1]Servicio de Neurología. Hospital Universitario Central de Asturias; [2]Servicio de Neurología. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; [3]Servicio de Neurología. Hospital del Mar; [4]Servicio de Neurología. Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí (Sabadell); [5]Servicio de Neurología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid; [6]Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Cruces; [7]Servicio de Neurología. Hospital Galdakao-Usansolo; [8]Servicio de Neurología. Hospital de Basurto; [9]Servicio de Neurología. Hospital Donostia-Donostia Ospitalea; [10]Servicio de Neurología. Hospital Txagorritxu; [11]Servicio de Neurología. Hospital de Navarra; [12]Servicio de Neurología. Hospital Reina Sofía.

Resumen

Objetivos: Migraña crónica (MC) y fibromialgia (FM) son dos trastornos de dolor invalidantes que coexisten frecuentemente. Los estudios REGAIN y CONQUER, que demostraron la eficacia de galcanezumab en MC, excluyeron a pacientes con diagnóstico de FM. Nuestro objetivo es demostrar la efectividad de galcanezumab en una serie de pacientes con MC y FM.

Material y métodos: El Consorcio GALCA-ONLY es un conjunto de 12 hospitales españoles con unidad o consulta monográfica de cefalea que disponían de galcanezumab, durante un periodo mínimo de 1 año, como único anticuerpo anti-CGRP para el tratamiento de la migraña. Se realizó una base de datos conjunta y consensuada con variables basales. El seguimiento se realizó cada 3 meses recogiendo los días de cefalea al mes (DCM), y escala HIT6 entre otros.

Resultados: De 759 pacientes con diagnóstico de FM un 10,54% presenta MC y FM (97,5% mujeres). La edad media de inicio de tratamiento fue de 51,68 ± 10,7 años. El 83,8% de los pacientes había utilizado 3 o más tratamientos orales, y el 61,3% había abandonado toxina botulínica en la visita basal o previo al inicio de galcanezumab. En aquellos pacientes que completaron un año de tratamiento se observa una reducción de 11,77 DCM ($p < 0,001$) y de 10,48 puntos en la escala HIT-6 ($p < 0,001$) a los 3 meses del inicio, y sostenido a lo largo del tratamiento. El 33,8% abandonó el tratamiento por falta de beneficio o presencia de efectos adversos.

Conclusión: El galcanezumab es un tratamiento efectivo, también en pacientes con migraña crónica y fibromialgia.

2667-0496 / © 2022, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Neurología (SEN). Todos los derechos reservados.