



## 17843 - ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CGRP EN PACIENTES CON MIGRAÑA RESISTENTE Y FIBROMIALGIA, ¿SON IGUAL DE EFICACES?

Olivier, M.; Nieves Castellanos, C.; Pérez García, J.; Fabrich Marín, M.I.; Díaz Insa, S.

Servicio de Neurología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

### Resumen

**Objetivos:** La fibromialgia es frecuentemente reportada como comorbilidad en migraña crónica. Objetivo: evaluar si pacientes con migraña crónica, con y sin fibromialgia responden igual a los anticuerpos anti-CGRP (a-CGRP).

**Material y métodos:** Subanálisis de estudio prospectivo en pacientes con migraña crónica resistente, tratados con a-CGRP. Valoramos: días de migraña (MHD), cefalea (HHD) y tratamiento sintomático (MusD) y escalas (HIT, 6 MIDAS, calidad de vida (MsQol). Evaluando respuesta a los 3 y 6 meses en pacientes con fibromialgia (Fi) y sin ella (No-Fi).

**Resultados:** Grupo No-Fi, 283 pacientes. 78% mujeres, edad media 46 años. Antes del tratamiento: 22,6 HHD, 19,4 MHD y 19 MsuD. 3 meses después: 9,7 HHD, 7,8 MHD y 8 MsuD. Tras 6 meses: 10,7 HHD, 9,6 MHD, 8,6 MsuD; y una reducción en: HIT-6 de 9,5 puntos, MIDAS 46,5 y MsQol aumenta 20,5 puntos. Grupo FI, 53 pacientes, 98% de mujeres, edad media 53 años. Inicialmente 23,9 HHD, 19,9 MHD y 18,9 MsuD. A los 3 meses: 8,9 HHD, 6,4 MHD y 5,8 MsuD. Tras 6 meses 10,7 HHD, 8,7 MHD, 8,1 MsuD y una reducción en: HIT-6 de 8,8 puntos, MIDAS 63,5 puntos y MsQol aumenta 22,3 puntos. 30% de los pacientes en el grupo FI reportaron efectos adversos; 36% en el No-Fi.

**Conclusión:** Ambos grupos responden a a-CGRP, aunque en nuestro estudio, la mejoría parece ser más retardada comparando con pacientes sin fibromialgia. Calidad de vida y discapacidad mejoran ligeramente más en pacientes con fibromialgia. Consideramos que pacientes con migraña y fibromialgia deben tratarse con a-CGRP independientemente de su copatología.