



Neurology perspectives



19937 - Impacto de las comorbilidades en el pronóstico de los pacientes con ictus isquémico de circulación anterior sometidos a trombectomía mecánica con reperusión exitosa

Bautista Lacambra, M.¹; Tejada Meza, H.¹; Tique Rojas, L.¹; Horna Cañete, L.¹; Viscasillas Sancho, M.¹; García Alonso, I.¹; Serrano Ponz, M.¹; Barrena Caballo, M.²; Marta Moreno, J.¹

¹Servicio de Neurología. Hospital Universitario Miguel Servet; ²Servicio de Radiología. Hospital Universitario Miguel Servet.

Resumen

Objetivos: Analizar el impacto de las comorbilidades en el pronóstico funcional de los pacientes con trombo en circulación anterior manejados mediante TM con reperusión exitosa.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo y de base hospitalaria. Se seleccionaron todos los pacientes que padecieron un ictus isquémico secundario a trombo en circulación anterior, con mRS previo # 2 y fallecimiento).

Resultados: Se reclutaron 477 pacientes (52,6% mujeres, edad media $72,5 \pm 12,8$ años). La etiología más frecuente fue la cardioembólica (54,5%). La comorbilidad más frecuente fue la HTA (62,8%) seguida de la DLP (53,5%). La mediana de comorbilidades por paciente fue 5 (RIC 3-7). En el análisis multivariante las comorbilidades asociadas significativamente con mRS > 2 a tres meses fueron DM, enolismo, EPOC e hiperuricemia. Para mortalidad lo estuvieron DM, arteriopatía periférica, ERC, EPOC e insuficiencia venosa. El ICC y la gran comorbilidad (ICC ≥ 3) demostraron significación en el análisis multivariante para ambas variables resultado.

Conclusión: Los pacientes con ictus presentan una elevada multimorbilidad, especialmente en FRCV. Existe una asociación entre determinadas comorbilidades y el mal pronóstico de la TM a pesar de conseguir una reperusión exitosa, mientras que no se encuentra asociación con el número total de comorbilidades. Las escalas ponderadas como el IC podrían ayudar a predecir dicho pronóstico.