

tratamento é longo e podem ocorrer danos nos tecidos dentários e de suporte. São diversos os fatores a considerar numa decisão clínica que contemple ou não a correção da transposição dentária: a aceitação do paciente, a experiência do ortodontista, a estética e a função oclusal, se a transposição deve envolver extrações de dentes, se o alinhamento dentário deve manter a transposição ou se devemos optar pela correção completa da transposição ortodonticamente.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemed.2016.10.156>

SPODF #8. Tratamento ortodôntico com extração de primeiros molares

Joana Cristina Silva *, Ana Carvalho, Maria Cristina Figueiredo Pollmann, Saúl Castro, Afonso Pinhão Ferreira

Introdução: O tratamento ortodôntico implica, por vezes, o recurso a extrações dentárias, frequentemente para corrigir uma discrepância dentomaxilar ou para camouflhar uma relação sagital intermaxilar incorreta. Habitualmente, os dentes escolhidos são os pré-molares. Porém, justifica-se a extração de 1.º molares permanentes em casos de cárie e/ou restaurações extensas, tratamento endodôntico, hipoplasias do esmalte e outras malformações dentárias. Esta opção pode ainda fundamentar-se no tratamento de mordidas abertas anteriores, na hiperdivergência maxilomandibular e na correção de apinhamento posterior. Outra das potenciais indicações é a correção de más oclusões de classe II com perfil retrusivo, já que tem menos impacto na estética facial do que a extração de pré-molares superiores. A extração de molares pode também ser considerada, em casos de classes II subdivisão, mas de forma assimétrica.

Descrição do caso clínico: Paciente do género feminino, com 13 anos, compareceu a uma consulta médica dentária para avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico. Do exame clínico destacam-se uma má oclusão de classe II dentária e esquelética, com um perfil retrusivo e hiperdivergência, e ainda uma sobremordida incisiva horizontal de 8 mm e vertical de 2 mm e restaurações extensas nos dentes 16, 36 e 46.

Discussão: Após estudo ortodôntico, optou-se por um tratamento ortodôntico com extração dos 16 e 26 e perda de ancoragem anterior, para reduzir a sobremordida horizontal incisiva; em associação garantiu-se uma ancoragem máxima posterior, com uma tração extraoral alta e elásticos de classe II.

Conclusões: As características faciais e dentárias da paciente, a destruição dos primeiros molares permanentes e a presença dos gérmenes dos terceiros molares foram pontos-chave na decisão do plano de tratamento. Este tratamento permitiu um resultado oclusal mais sobreponível à oclusão ideal, na medida em que preservou a esfericidade funcional da oclusão, mantendo todos os incisivos, caninos e pré-molares e assegurou 4 molares, em cada arcada.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemed.2016.10.157>

SPODF #9. Tratamento da hipoplasia mandibular: uma nova perspetiva ortodôntico-cirúrgica



Joana Queiroga *, Jéssica Scherzberg, Luísa Maló, Artur Ferreira, Francisco do Vale

Introdução: Pacientes com deformidades dentoesqueléticas de classe II constituem um desafio para o ortodontista e para o cirurgião maxilofacial. Para além da obtenção de uma oclusão estável, é fundamental restabelecer a proporcionalidade e harmonia da face. A distração osteogénica deve ser considerada uma opção de tratamento da hipoplasia mandibular.

Descrição do caso clínico: Paciente do sexo feminino, 21 anos, classe II esquelética com necessidade de tratamento ortodôntico-cirúrgico. Foi colocado um distrator dento-ancorado, de fabrico individualizado. Cirurgicamente, foi realizada a corticotomia entre os pré-molares inferiores, com ligeiro desvio, de forma a preservar a continuidade do feixe vasculo-nervoso alveolar inferior. Realizou-se a osteotomia e, após a verificação da mobilidade óssea, ensaiou-se o distrator. Após 7 dias de latência, foi iniciado o processo de aumento do comprimento mandibular, que se fez diariamente, a uma velocidade de distração de 1 mm/dia durante 10 dias. Após o período de distração, o dispositivo foi bloqueado, seguindo-se um período de consolidação de 12 semanas. Verificou-se um verdadeiro alongamento da mandíbula, traduzido por um aumento do comprimento da arcada mandibular de 8 mm em cada quadrante. Para controlar o processo de osteogénesis, foram realizadas radiografias panorâmicas.

Discussão: A distração osteogénica é uma alternativa à osteotomia sagital bilateral da mandíbula, com a vantagem de não necessitar de fixação intermaxilar, o período de recobro ser mínimo, com menor dor e menor parestesia, o que a torna um procedimento não incapacitante. A utilização do distrator dento-ancorado permite que o procedimento cirúrgico seja muito menos invasivo, sem sequelas cicatriciais, e que a colocação seja mais prática e menos traumática para o doente, evitando uma segunda intervenção cirúrgica para a remoção do distrator.

Conclusões: A distração osteogénica dento-ancorada foi eficiente no alongamento sagital da mandíbula. Desta forma, este procedimento representa uma nova perspetiva ortodôntico-cirúrgica do tratamento da hipoplasia mandibular.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemed.2016.10.158>

POSTER DE TRABALHOS DE REVISÃO

SPODF #10. Disjuntor de McNamara: as mais-valias de uma férula como disjuntor



S. Viegas, M. Fernandes, D. Pereira, P. Retto, A. Delgado

Consulta Assistencial de Ortodontia, ISCSEM

Introdução: A disjunção maxilar, ou expansão rápida da maxila (ERM), tem sido muito estudada, devido ao seu potencial de correção das desarmonias transversais da maxila e de aumentar o perímetro de arcada sem alterar desfavoravelmente o perfil facial.

Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre as vantagens do disjuntor de McNamara, por este ter na sua constituição uma férula de acrílico.

Método: Foi efetuada uma pesquisa no PubMed, MedLine, Google Scholar, B-on, Scielo e Science Direct, entre 1988-2015, utilizando as palavras-chave: bonded palatal expander; acrylic splint palatal expander.

Resultados: Foram encontrados 45 artigos, incluindo estudos prospectivos, retrospectivos, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas descrevendo as vantagens do disjuntor de McNamara.

Conclusões: Os disjuntores de McNamara, além de corrigirem a transversa maxilar, produzem vários efeitos secundários desejáveis, como o efeito intrusivo que permite um maior controlo vertical durante a ERM; menos tipping que os disjuntores Hyrax; funciona como uma férula oclusal levando à desprogramação da mandíbula.

Implicações clínicas: A ERM com disjuntores de McNamara, com pistas de acrílico, tem demonstrado ser um protocolo mais eficaz como coadjuvante no tratamento ortodôntico do que simplesmente como um tratamento para corrigir a mordida cruzada posterior uni ou bilateral.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemed.2016.10.159>

SPODF #11. Tratamento interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar em doentes com malformações congénitas craniofaciais – 28 anos de experiência clínica diária

Marta Pires, Maria João A. de Castro

Consulta Multidisciplinar de Malformações Congénitas Craniofaciais – CHLN

O tratamento dentofacial ideal em doentes portadores de malformações congénitas da face envolve uma colaboração sinérgica de todos os intervenientes de uma equipa interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Muitas vezes, há falta de equipas que trabalhem com a transdisciplinaridade. As especialidades intervenientes desta equipa ideal, necessárias para o êxito do tratamento, são: obstetrícia, pediatria, ortopedia dentofacial, cirurgia, estomatologia/medicina dentária, otorrinolaringologia, terapia da fala, neurocirurgia, psiquiatria, enfermagem e serviço social. Estes especialistas intervêm em timings específicos e definidos; muitos deles atuam em vários tempos cronológicos e com tipos de terapêuticas/intervenções/procedimentos também diferentes. Estas intervenções e procedimentos são descritos cronologicamente no poster a apresentar na XXVIII Reunião Científica Anual da SPODF 2016, com o objetivo de mostrar como uma equipa trabalha, para que todos os profissionais funcionem de uma maneira uniforme e sinérgica, ou seja, os membros da equipa interagindo entre si, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos portadores de malformações congénitas craniofaciais – o embrião, o recém-nascido, a criança, o adolescente e o adulto.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemed.2016.10.160>

SPODF #12. Clear Aligners: conceito e diferentes sistemas



J. Delgado, D. Pereira, M. Fernandes, P. Retto, A. Delgado

Consulta Assistencial de Ortodontia, ISCSEM

Introdução: Os clear aligners são uma boa alternativa (especialmente em jovens adultos com dentição permanente) para proceder ao tratamento ortodôntico, na medida em que não levantam tantas questões estéticas. O objetivo desta revisão bibliográfica é definir o conceito de clear aligners, assim como identificar e caracterizar os diferentes sistemas.

Métodos: Foi elaborada uma pesquisa bibliográfica nos motores de busca PubMed, B-on, Scielo e Science Direct. Também foi realizada uma pesquisa num livro. Utilizaram-se na pesquisa as palavras-chave: «clear aligners», «Invisalign», «aesthetic appliances», «thermoplastic appliances» e «orthodontic appliances». Foram selecionadas publicações nas línguas inglesa e espanhola. Foram incluídos artigos e livros publicados entre 2000-2015.

Resultados: Foram selecionados 32 artigos científicos e incluído um livro. Foram identificados 61 sistemas de clear aligners, em que apenas 27 tratam o setor anterior (2.^º e 5.^º sextantes), enquanto 34 são capazes de tratamentos incluindo setores posteriores. Dos sistemas identificados, 44 caracterizam-se por exclusivamente incorporarem aparelhos ortodônticos transparentes, enquanto 17 possuem outros meios auxiliares na movimentação ortodôntica.

Conclusões: Existem sistemas de clear aligners que apresentam limitações e apenas tratam casos simples, a nível anterior ou recidivas, após tratamento ortodôntico. Outros sistemas têm a capacidade de corrigir diversos tipos de maloclusões mais severas. Existem também sistemas que incorporam brackets, arcos, attachments e outros acessórios para agilizar e potenciar outro tipo de movimentos.

Implicações clínicas: O ortodontista tem de avaliar cada caso e decidir se os clear aligners podem ser uma opção, sendo que, para isso, tem de conhecer muito bem o sistema que está a oferecer ao seu paciente.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemed.2016.10.161>

SPODF #13. Anomalias dentárias associadas: a importância no diagnóstico em ortodontia



João Baptista, Ana Raquel Barata, Válter Alves, Ana Sintra Delgado

Consulta Assistencial de Ortodontia, ISCSEM

Introdução: Várias doenças apresentam no seu fenótipo anomalias dentárias, cada vez mais identificadas como características preditivas e de diagnóstico. A associação de anomalias dentárias de número, forma e tamanho sugere um controlo genético e uma etiologia biológica comum.

Métodos: Pesquisa do tema em artigos da base Pubmed através das palavras-chave: «dental anomalies AND associations», «dental anomalies AND orthodontic diagnosis» e «interrelated dental anomalies», em todo o tipo de artigos, nos anos 2009-2015.