

Antipsicóticos atípicos y ancianos con demencia: sigue la polémica

La comercialización de estos fármacos generaba expectativas de solución de efectos adversos, eficacia y seguridad frente a los antipsicóticos típicos, sobre todo en pacientes ancianos con demencia y síntomas conductuales. Su uso extenso desveló posibles riesgos de accidentes cerebrovasculares, lo que provocó hace 3 años la aparición de notas de alerta farmacéuticas y cambios en la ficha técnica. Actualmente están restringidos y precisan visado de inspección en los mayores de 75 años.

«Los estudios de indicación/prescripción y el desarrollo de protocolos terapéuticos o guías clínicas facilitarían la resolución del conflicto ético entre la actitud terapéutica con el paciente y el principio de primum non nocere.»

Página 311

Valoración de actividades instrumentales de la vida diaria: identificación de ítems para un cuestionario


Estudio Delphi para seleccionar ítems de cara a diseñar un cuestionario de valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria de personas mayores residentes en la comunidad. Participan 57 expertos en 3 rondas de consulta. Treinta profesionales respondieron a los 3 correos, seleccionando según la puntuación obtenida un total de 10 ítems definitivos.

«Se identifican ítems para la creación de un nuevo cuestionario de valoración de las AIVD, basados en un consenso multidisciplinario. Aportarán validez de contenido a la futura escala.»

Página 313

El CICAA es un cuestionario válido y fiable para evaluar la comunicación clínica


Veinte profesionales expertos en comunicación realizaron 31 entrevistas, con pacientes atendidos por enfermeros, médicos de atención primaria y especializada y residentes, con pacientes agudos y crónicos, reales y estandarizados. La escala evaluativa inicial de 36 ítems basada en un modelo teórico de entrevista acabó recogiendo 29 ítems. El CICAA mostró ser un cuestionario válido y fiable para evaluar la comunicación clínica de diferentes profesionales sanitarios y pacientes.



Página 320

Relación hiperhomocisteinemia y cardiopatía isquémica crónica

Estudio de casos y controles no emparejados (1:3) para evaluar la magnitud de la asociación entre hiperhomocisteinemia y cardiopatía isquémica crónica. Se analizan 114 casos y 295 controles no emparejados. La diferencia de hiperhomocisteinemia entre los casos y los controles fue significativa, con asociación entre hiperhomocisteinemia y cardiopatía isquémica crónica (*odds ratio*, 2,76).



Página 325

La falta de control prenatal se asocia a la depresión posparto en Colombia

La tasa de incidencia de depresión posparto fue de un caso por cada 1.000 días/persona de seguimiento. Sólo los antecedentes personales de depresión, la falta de control prenatal y los antecedentes de disforia permanecieron asociados. Se observa que éste es un problema poco recogido y en Bucaramanga puede considerarse como un problema de salud pública. Su frecuencia podría disminuir si se realiza un control prenatal adecuado y un seguimiento estrecho de las mujeres puerperas durante las primeras semanas del posparto.

TABLA 3
Modelo final de Cox^a

Variables	HR (IC del 95%)	p
Antecedentes personales de depresión	3,87 (1,02-14,65)	0,046
Ausencia de consultas de control prenatal	3,87 (1,13-13,24)	0,031
Presencia de disforia	15,13 (1,94-118,2)	0,01

HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

^aLog-likelihood = -49,50.

Página 332

Los pósters informativos incrementan el conocimiento sobre la prescripción

La difusión de pósters y folletos dirigidos a los pacientes es eficaz para incrementar el conocimiento sobre la posología de su medicación y para que el médico conozca más la medicación concomitante a su prescripción.

El estudio se realizó en un servicio de urgencias médicas no hospitalarias, en el que se observó que en el 51% de los pacientes el médico no conocía la medicación concomitante y el 49% de los pacientes desconocía la posología.

«En una receta, tu papel es vital.»

Página 339