



## 257/64 - SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST... ¿VARÍA CON LA EDAD LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO?

A.A. Rojas Sánchez<sup>1</sup>, A.M. García Bellón<sup>2</sup>, A.M. González González<sup>3</sup>, C. Lara García<sup>4</sup>, J.A. Arboleda Sánchez<sup>5</sup> y M. de Mora Martín<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Médico Residente de 2º año de Cardiología; <sup>2</sup>FEA Cardiología; <sup>4</sup>Médico Residente de 4º año de Cardiología; <sup>5</sup>FEA Medicina Intensiva; <sup>6</sup>Jefe de Servicio de Cardiología. Hospital Regional Universitario de Málaga. <sup>3</sup>FEA Cardiología. Hospital de Poniente. Algeciras.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** Desconocemos si IAM en edad temprana incorpora pronóstico grave a largo plazo.

**Material y métodos:** Prospectivo y multicéntrico de FRCV en pacientes con SCACEST incluidos en Ariam Andalucía desde 1 enero 2012 al 31 diciembre 2016. Estudio comparativo en pacientes mayores y menores de 45 años. Para la comparación usamos chi cuadrado, nivel de significación 95%.

**Resultados:** 11.575 pacientes, 10,1% menores de 45 años. Varones menores de 45 años más fumadores (72% vs 39%, p < 0,001), menos hipertensos (27% vs 54,3%, p > 0,0001) menos diabéticos (7,8% vs 29,1%, p > 0,001). Mujeres 45 años más fumadoras (62,5% vs 12,6%, p > 0,0001) menos dislipémicas (23,2% vs 46,5%, p < 0,0001).

	45 años	> 45 años	p
Hipertensión arterial	294 (25%)	5.454 (52,4%)	0,0001
Diabetes mellitus	84 (7,1%)	2.838 (27,3%)	0,0001
Dislipemia	421 (35,8%)	4.294 (41,3%)	0,0001
Fumador	896 (76,2%)	4.073 (39,2%)	0,0001
Obesidad	250 (21,3%)	1.895 (18,2%)	0,012

**Conclusiones:** El tabaquismo factor de riesgo más relacionado en SCACEST en menores 45 años.