



257/60 - UTILIDAD DE LA EXCURSIÓN SISTÓLICA DEL ANILLO TRICUSPÍDEO (TAPSE) Y LA VELOCIDAD POR DOPPLER TISULAR DEL ANILLO LATERAL MITRAL EN EL DIAGNÓSTICO DEL RECHAZO AGUDO EN PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE CARDIACO

E. Martín Dorado¹, M. Ruiz Ortiz², S. Rodríguez Diego³, D. Mesa Rubio², J.J. Sánchez Fernández⁴, L. Carnero Montoro¹, A. López Granados², J.M. Arizón del Prado², M. Pan Álvarez-Ossorio² y M. Delgado Ortega²

¹Médico Residente de 2º año de Cardiología; ²FEA Cardiología; ³Médico Residente de 3er año de Cardiología; ⁴Médico Residente de 4º año de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen

Introducción y objetivos: Existe evidencia publicada sobre la sensibilidad del strain longitudinal del ventrículo izquierdo y derecho medidos por ecocardiografía “speckle tracking” para el diagnóstico del rechazo agudo después de un trasplante cardiaco. Nosotros proponemos dos parámetros convencionales ecocardiográficos (TAPSE y velocidad por Doppler tisular del anillo mitral lateral) como herramientas sensibles para el diagnóstico del rechazo agudo (RA).

Material y métodos: Se realizaron estudios ecocardiográficos exhaustivos en el primer año postrasplante en las 3 primeras horas de la biopsia endomiocárdica de rutina a 18 pacientes entre el 15/9/2014 y el 31/10/2016. Analizamos la asociación entre: 1) la suma de la velocidad del anillo lateral mitral (s') y protodiastólica (e'), en valores absolutos, medidos por Doppler tisular; y 2) TAPSE con diferentes grados de RA.

Resultados: Fueron analizados un total de 147 BEM y estudios ecocardiográficos, encontrándose asociación estadísticamente significativa ($p < 0,005$) para todos los grados de RA; grado 0 (TAPSE $14,8 \pm 4,2$; $s' + e' 23,3 \pm 4,7$) grado 1 (TAPSE $13,1 \pm 4,1$; $s' + e' 23,8 \pm 6,6$) y especialmente grado ? 2R (TAPSE $10,7 \pm 3,8$; $s' + e' 16,8 \pm 4,4$). Se elaboraron las curvas ROC de cada una de estas variables en el diagnóstico del RA grado ? 2R, resultando un área bajo la curva para el TAPSE de 0,70 (IC95% 0,55-0,84, $p = 0,01$) y para la suma ($s' + e'$) de 0,81 (IC95% 0,69-0,93, $p = 0,0005$).

Conclusiones: En este estudio, TAPSE y $s' + e'$ del anillo lateral mitral se asocian de forma estadísticamente significativa con la presencia de RA, si se confirma este hallazgo en futuros estudios podría ser una herramientas útiles en el diagnóstico del mismo.