



323/99 - ANILLO PROTÉSICO GEOFORM® EN INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA/GRAVE: VALORACIÓN DE LA RECIDIVA TRAS CIRUGÍA

J. Rodríguez Moreno¹, J. Rodríguez Moreno¹, R. Campos Arjona², M.M. Millán Gómez³, R. Melero Giménez⁴, R. Bravo Marqués⁵, C. Porras², G. Sánchez², J.M. Melero Tejedor² y M. Jiménez Navarro²

¹Facultad de Medicina de Málaga. Málaga. ²UGC del Corazón Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. ³Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. ⁴Facultad de Medicina de Málaga. UGC del Corazón Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. ⁵Hospital Costa del Sol. Marbella.

Resumen

Introducción y objetivos: Los resultados a largo plazo del tratamiento quirúrgico en la insuficiencia mitral (IM) funcional se consideran subóptimos. El anillo Geoform® está diseñado para tratar la IM funcional en la miocardiopatía dilatada. Describimos la recidiva de IM en pacientes tratados con dicho anillo.

Material y métodos: Recogida retrospectiva de 42 pacientes tratados con anillo Geoform® entre enero 2008 y junio 2014. El seguimiento se realizó a través de la Historia Clínica y se comprobó la mortalidad según los datos del Índice Nacional de Defunción.

Resultados: La media de edad fue de $66,6 \pm 10,3$ años (64,3% hombres, 35,7% mujeres). La presencia de HTA fue 24 (57,1%) y diabetes 10 (23,8). La FE media fue de $43,7 \pm 13,4\%$. La mortalidad intrahospitalaria por causas diversas fue de 7 (16,7%) pacientes, mientras que la mortalidad en el seguimiento a largo plazo se situó en 12 (28,5%) pacientes. Inicialmente el grado de IM por ecocardiograma era de: moderada 5 (14,3%), moderada-grave 16 (45,7%) y grave 14 (40%). El ecocardiograma de control tardío de seguimiento de 35 pacientes reveló que en ningún caso recidivó la IM, en 1/35 (2,85%) el grado de IM se mantuvo estable y en 34/35 (97,15%) mejoró el grado de IM. No apreciamos diferencias en las características basales (edad, género, HTA, diabetes, dislipemia, IRC) en relación a la mortalidad.

Conclusiones: Los datos obtenidos sugieren la ausencia de recidiva de la IM con el uso del anillo protésico Geoform® en pacientes con IM secundaria a miocardiopatía dilatada.