



## P-235 - Utilidad de la ?-fetoproteína en el seguimiento y recurrencia de los tumores papilares de vesícula

B. Sánchez Pérez, C. Rodríguez Silva, J.A. Blanco Elena, J.L. Fernández Aguilar, F.J. León Díaz, J.A. Pérez Daga, M.Á. Suárez Muñoz y J. Santoyo Santoyo

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

### Resumen

**Introducción:** La alfafetoproteína (?FP) es un marcador clínicamente útil para el carcinoma hepatocelular, hepatoblastomas y tumores testiculares no seminomatosos. Su utilidad en el cáncer de vesícula biliar (CVB) es excepcional. Sin embargo, en una veintena de casos se ha descrito su elevación asociado fundamentalmente a carcinoma de células claras, papilares, hepatoide y carcinosarcoma. En estos casos, el brusco descenso de los niveles de ?FP tras la cirugía, nos permite su uso clínico como claro marcador de seguimiento y recaída.

**Caso clínico:** Mujer de 69 años sin antecedentes personales de interés, en estudio por cólicos biliares de repetición. A la exploración se palpaba masa en hipocondrio derecho. ECO ABD: Vesícula de 15 × 7 cm, con contenido sólido vascularizado en su interior. TAC ABD: vesícula muy distendida con masa en su interior y posible infiltración del lecho hepático, produciendo impronta sobre la vena porta así como a nivel de la vía biliar, no se evidencian adenopatías locorregionales. Se objetivó perfil hepático sin alteraciones y serología viral negativa, destacando ?FP de 775 ng/ml, resto de marcadores tumorales dentro de la normalidad. Ante el diagnóstico de CVB, se realizó colecistectomía y bisegmentectomía IVb-V mediante abordaje convencional. La anatomía patológica fue informada como carcinoma papilar con componente infiltrativo que alcanza la capa muscular (T1b N0). Segmentos hepáticos con inflamación crónica portal y focos de dilatación sinusoidal. Bordes de resección libres de neoplasia. En el postoperatorio presentó fistula biliar de bajo débito que se solventó con tratamiento conservador siendo alta el 10º PO. Los niveles de ?FP descendieron progresivamente: 5º, 15º, 30º y a los 45 días PO: 315 ng/ml, 70 ng/ml, 35 ng/dl y 5 ng/dl. La paciente lleva un año en seguimiento sin elevación de ?FP y con pruebas de imagen negativas.

**Discusión:** La utilidad de los marcadores tumorales en diagnóstico preoperatorio de CVB, pero sobre todo en el seguimiento y como indicadores de recurrencia es, al menos, dudoso. La incidencia de CVB productoras de ?FP es excepcional (solo se han descrito una veintena de casos en la literatura) y relacionándose fundamentalmente con carcinomas papilares y de células claras. Sin embargo, se ha observado un descenso brusco de la ?FP tras la resección completa de la neoplasia y elevación de la misma con la recidiva de la enfermedad. Por ello, la monitorización de la ?FP en este contexto, constituye una excelente alternativa de seguimiento y vigilancia de la recurrencia.