



www.elsevier.es/cirugia

O-274 - EL PÁNCREAS COMO ÓRGANO COMPENSADOR DE LA SECRECIÓN DE GRELINA DESPUÉS DE GASTRECTOMÍA VERTICAL

Camacho, Alonso¹; Zubiaga, Lorea²; Mayo-Ossorio, María Angeles¹; Pacheco-García, José Manuel¹; Almorza-Gomar, David¹; Prada-Oliveira, José Arturo³; Pérez-Arana, Gonzalo³

¹Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; ²Université de Lille, Lille; ³Universidad de Cádiz, Cádiz.

Resumen

Introducción: La gastrectomía vertical (GV) continúa liderando estadísticas como una de las cirugías bariátricas que más se realiza en el mundo. Una de las principales consecuencias de esta técnica es el control del apetito asociada a la secreción de grelina una hormona que se libera fundamentalmente en las células enteroendocrinas del fondo y el cuerpo gástrico. Los valores de grelina tras una GV se han asociado con la pérdida de peso que ocurre en los primeros meses del postoperatorio de esta técnica. Sin embargo, parece que a largo plazo, estos valores pierden relevancia.

Objetivos: Evaluar los niveles de grelina después de de GV con el paso del tiempo haciendo énfasis en las células epsilon del páncreas como fuente secundaria de secreción de esta hormona.

Métodos: Se realizó un estudio experimental en ratas Wistar macho normoglucémicas para valorar los cambios en las células epsilon. Los animales fueron distribuidos en 4 grupos experimentales: control, control-Sham, GV y bypass gástrico en Y de Roux (BGYR) y dos grupos de control. Se evaluó los valores de grelina en sangre y los cambios histológicos del páncreas mediante pruebas de inmunofluorescencia tres meses después de cirugía.

Resultados: En las ratas sometidas a GV se evidenció con el paso del tiempo un aumento significativo ($p < 0,05$) niveles de grelina en sangre así como un incremento de la presencia de células epsilon secretoras de grelina en el páncreas en comparación con los grupos de control y control-Sham. El incremento de las células epsilon se relacionó con la neogénesis, como reveló el marcador de la neurogenina-3 ($p < 0,05$). En las ratas sometidas a BGYR no se observó cambios de grelina en el suero basal ni el incremento de las células epsilon en el páncreas.

Conclusiones: Las ratas sometidas a GV mostraron a larga data un aumento de los niveles de grelina en sangre aunado a un aumento de la presencia de células epsilon en el páncreas lo que es indicativo de una función pancreática embrionaria ontogénica, que actúa de forma compensadora y que podría justificar la pérdida de efectividad de la GV a lo largo del tiempo.