



## O-276 - EVALUACIÓN DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA TÉCNICA SADI-S Y EFECTO SOBRE CALIDAD DE VIDA. COMPARACIÓN CON TÉCNICAS DE MALABSORCIÓN CLÁSICAS

Sáez Rodríguez, Carlos; Sanz Casero, Joel; Picazo Marín, Sara; Catalán Garza, Vanesa; Pérez Aguirre, María Elia; Rubio Herrera, Miguel Ángel; Sánchez Pernaute, Andrés; Torres García, Antonio José

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** El objetivo principal es la evaluación de la pérdida ponderal y su mantenimiento durante los primeros 5 días de seguimiento tras la técnica SADI-S (Single anastomosis duodeno-ileal bypass with sleeve) analizando secundariamente de forma comparativa los resultados obtenidos tras SADI-S con los evidenciados tras realización de cirugías malabsortivas tipo Cruce Duodenal (CD) y Derivación biliopancreática tipo Scopinaro (DBP).

**Métodos:** Para llevar a cabo este estudio, se ha realizado un estudio de cohortes históricas con carácter retrospectivo con dos grupos a estudio, los pacientes que se intervinieron mediante SADI-S y aquellos en los que se realizó una técnica clásica. Todos los pacientes fueron intervenidos en el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos. El periodo de seguimiento fue de 5 años.

**Resultados:** Se incluyeron 99 pacientes en el estudio, 49 fueron intervenidos mediante SADI-S y 50 mediante una de las técnicas clásicas (CD/DBP). La edad media de la serie fue de  $44,80 \pm 11,1$  años, con un IMC medio de  $48,38 \pm 8,6$  kg/m<sup>2</sup>. Tras 5 años, el IMC del grupo SADI-S fue de 29,06 kg/m<sup>2</sup>, mientras que en CD/DBP fue de 31,25 kg/m<sup>2</sup> ( $p = 0,058$ ). El EWL% a 5 años fue  $85,31 \pm 23,0\%$  para SADI-S y de 71,32% en CD/DBP ( $p = 0,008$ ). El TWL% a los 5 años entre ambas técnicas no mostró diferencias significativas en ambos grupos (39,21% vs 34,18%,  $p = 0,061$ ). El número medio de deposiciones diarias en 5 años en la cohorte SADI-S fue de 2, mientras que en CD/DBP fue entre 3-4 ( $p = 0,001$ ). Los triglicéridos fueron significativamente más bajos en SADI-S respecto a CD/DBP ( $78,69 \pm 31,6$  vs  $96,87 \pm 45,6$ ,  $p = 0,040$ ). Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de vitamina D ( $p = 0,036$ ) y oligoelementos como selenio y cobre de ambas cohortes ( $p = 0,024$  y  $0,001$ ). No hubo diferencias entre los valores de calcio, hierro y vitaminas A, E y B12.

**Conclusiones:** Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas respecto a los parámetros ponderales en ambas cohortes, presentando una pérdida de peso significativamente superior sin reganancia a largo plazo en los pacientes a los que se les ha realizado un procedimiento tipo SADI-S, sin empeoramiento de los parámetros nutricionales y con una menor tasa de diarrea malabsortiva, aportando una mejor calidad de vida al paciente. Por ello, el SADI-S se considera una alternativa válida frente a las técnicas de malabsorción clásicas (CD/DBP) en pacientes con obesidad mórbida.