



www.elsevier.es/cirugia

P-288 - TRANSILIAC HERNIA AFTER BONE GRAFT

Ordóñez Trujillo, Jorge Antonio; Espert Ibáñez, Juan José; de Lacy Fortuny, Antonio María

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Resumen

Las hernias lumbares son una patología infrecuente; aproximadamente 300 casos han sido descritos en la literatura. Por otra parte, este tipo de hernia puede ser una complicación secundaria a la donación de injerto autólogo de cresta iliaca. El riesgo de incarceración y de estrangulación de este tipo de hernias es del 25% y 10% respectivamente, por lo cual el manejo quirúrgico está indicado. Han sido descritos diversos abordajes para reparar las hernias lumbares como la técnica transabdominal, retroperitoneal y laparoscópica. Nosotros describimos un caso de una hernia transilíaca que había sido manejada quirúrgicamente en dos ocasiones por abordaje transabdominal con fracaso de la técnica por lo cual optamos por realizar una reparación laparoscópica reduciendo el contenido de la hernia y fijando una malla Dualmesh® con tackers reabsorbibles. El abordaje laparoscópico demostró ser reproducible, seguro y estar asociado a todas las ventajas ya conocidas de la cirugía mínimamente invasiva.