



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## O-065 - Resultados de la reparación de hernia ventral por laparoscopia con colocación de malla compuesta flexible Ethicon Pysiomenth™

Morell, Natàlia; Julià, Elisabet; Hugué, Àlex; Bombuy, Ernest; Mans, Esther; Suñol, Xavier

Consorci Sanitari del Maresme, Mataró.

### Resumen

**Introducción:** La reparación laparoscópica de la hernia ventral (IPOM) es una técnica aceptada con resultados similares a la cirugía abierta. Para la realización de IPOM hay en el mercado numerosos tipos de malla, entre ellas la Malla compuesta Flexible EthiconPhysiomenth™. En mayo de 2016 Ethicon retiró esta malla después de obtener unos malos resultados en dos grandes estudios en los que se observaba elevadas tasas de recidiva.

**Objetivos:** Valorar la tasa de recidiva de pacientes con hernia ventral reparada por laparoscopia utilizando la Malla compuesta Flexible EthiconPhysiomenth™.

**Métodos:** Estudio observacional retrospectivo de base de datos de pacientes intervenidos de hernia ventral por laparoscopia con colocación de malla Ethicon Pysiomenth™ entre el 2014 y 2016 en el servicio de cirugía general del Hospital de Mataró. Los pacientes seleccionados presentaban hernias de la región umbilical menores de 5 cm de diámetro, obesidad (IMC > 30) o se trataba de hernias recidivadas. Se colocaron mallas de 15 × 15 cm o 15 × 20 cm fijadas con puntos cardinales de polipropileno transparietales y corona de tackers reabsorbibles.

**Resultados:** Entre los años 2014 y 2016 se intervinió en nuestro centro 16 pacientes. Los pacientes tenían una edad media de  $61 \pm 9,5$  años, un IMC medio de  $35,3 \pm 5$  Kg/m<sup>2</sup> y un 81% (13/16) presentaban hernia recidivada. El diámetro transverso medio de las eventraciones fue de  $3,9 \pm 1,2$  cm y el diámetro longitudinal fue de  $3,5 \pm 1,6$  cm. El tiempo quirúrgico medio de la intervención fue de  $68,1 \pm 13,5$  minutos con una estancia hospitalaria media de  $2 \pm 1$  días. De todos los pacientes intervenidos sólo uno presentó infección de la herida en forma de onfalitis. El seguimiento medio de 18 meses (12-36 meses). Cinco pacientes (31,25%) presentaron recidiva durante el seguimiento, 4 de ellos en los primeros 12 meses y uno a los 36 meses. Fueron reintervenidos 4 de 5 pacientes mediante abordaje anterior y técnica de RIVES, con buenos resultados.

**Conclusiones:** La reparación de hernia ventral por laparoscopia con colocación de malla compuesta flexible Ethicon Pysiomenth™ en nuestro centro ha obtenido malos resultados a corto plazo.