




Cirugía Española



www.elsevier.es/cirugia

P-366 - DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL. RESULTADOS TRAS IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO DE MANEJO AMBULATORIO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA

Juez, Luz Divina; Centeno Velasco, Alvaro; Arranz, Raquel; Vaello, Victor; Garriga, María; Pecharromán, Ines; Vicente, Agustina; Die, Javier

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Resumen

Introducción: La diverticulitis aguda no complicada es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los Servicios de Urgencias. Debido a su seguridad y éxito, el manejo ambulatorio se ha ido imponiendo en los últimos años. Presentamos nuestros resultados tras la aplicación de nuestro protocolo de manejo ambulatorio.

Métodos: Desde mayo 2016 hasta junio 2018 se recogen de forma retrospectiva y consecutiva 241 pacientes con diagnóstico de diverticulitis aguda no complicada tratados en el Hospital Ramón y Cajal. Se divide la muestra en 2 grupos: ingresados y manejo ambulatorio. Se analizan variables demográficas como sexo y edad, además de la prueba diagnóstica radiológica elegida y variables analíticas como PCR y leucocitos. En el grupo ingresado se analiza motivo de ingreso y evolución posterior. En el de manejo ambulatorio, se recoge porcentaje de éxito y fracaso, así como motivo del mismo.

Resultados: La tasa de éxito en el grupo ambulatorio es del 94,2%. El 5,8% ingresó para manejo conservador sin precisar cirugía en ningún paciente. La prueba diagnóstica más frecuente fue la ecografía abdominal (54%). No hay diferencias estadísticamente significativas al comparar ambos grupos en cuanto a edad, sexo, leucocitos y prueba diagnóstica seleccionada.

Conclusiones: Los resultados analizados muestran una implantación progresiva y segura del protocolo. Tras la aplicación del protocolo ambulatorio de diverticulitis aguda en el Ramón y Cajal, los resultados demuestran que se trata de un protocolo seguro con una tasa de éxito similar a la descrita en la literatura.