



www.elsevier.es/cirugia

VC-108 - PETEP (PREPERITONEAL) CRANEAL PARA EVENTRACIÓN M2-3 W1

Fernández Rodríguez, Manuel; Muñoz Rodríguez, Joaquin Manuel; Roman García de Leon, Laura; Grillo Marin, Cristian; Torguet Muñoz, María Eugenia; Fidalgo Martínez, Celia; López Monclús, Javier

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Resumen

Introducción: Las eventraciones aparecen hasta en el 20% de las laparotomías realizadas.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 72 años con antecedentes personales de resección ileocecal por enfermedad de Crohn, que acude derivado desde Digestivo por una eventración de línea media que le ocasiona molestias. En TC abdominal se evidencia una eventración en línea media grasa de una anchura de 28 mm. De forma discontinua hasta el nivel umbilical van produciéndose pequeñas eventraciones de grasa epiploica. Se realiza una eventroplasia preperitoneal eTEP (PeTEP) con colocación de malla de 30 × 10 cm de polipropileno.

Discusión: El PeTEP ofrece todas las ventajas del eTEP (posibilidad de colocación de mallas amplias, tratar varios defectos de forma simultánea, etc.), asociando un menor riesgo de lesión neurovascular y manteniendo íntegro el plano retromuscular de cara a posibles recidivas en el futuro.