



VC-121 - REPARACIÓN TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL (TAPP) PARA LA REPARACIÓN DE UNA HERNIA INGUINAL MULTIRRECIDIVADA

Moreno Suero, Francisco¹; Navaro Morales, Laura²; Licardie Bolaños, Eugenio Raúl³; Balla, Andrea²; Morales Conde, Salvador³

¹Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; ²Clínica USP Sagrado Corazón, Sevilla; ³Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Resumen

Introducción: El abordaje transabdominal preperitoneal (TAPP) para la hernia inguinal es un abordaje seguro y eficaz. Esta técnica se utiliza frecuentemente por su versatilidad para las hernias inguinales más complejas respecto a la técnica totalmente extraperitoneal (TEP) como pueden ser los casos de hernias inguinales recidivadas de procedimientos vía anterior habitualmente. Para la reparación de técnicas con abordaje posterior como el TEP puede ser un reto aún mayor.

Caso clínico: Paciente varón de 60 años que consulta por una hernia inguinal izquierda recidivada. Como antecedentes refiere dos reparaciones mediante hernioplastia TEP y una tercera intervención en la que se realizó un abordaje abierto anterior (técnica de Lichtenstein). Refiere nueva tumoración y molestias en la ingle izquierda a la exploración se evidencia una hernia inguinal izquierda recidivada. Presentamos el vídeo de la cirugía donde se opta por una reparación transabdominal preperitoneal (TAPP) con colocación de una doble malla anatómica y sellado con cola de fibrina. Posoperatorio sin incidencias y seguimiento adecuado con pared continente, sin dolor y con una vida activa deportivamente.

Discusión: El abordaje TAPP es seguro y eficaz para la reparación de la hernia inguinal recurrente tras un abordaje abierto y mínimamente invasivo.