



www.elsevier.es/cirugia

O-054 - INCIDENCIA DE COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN UNA COHORTE DE MUJERES CRIBADAS. PROYECTO CAMISS (200-2009)

Blay Aulina, Lidia¹; Romero, Anabel²; Louro, Javier²; Oh Uiginn, Kevin¹; Baré, Marisa³; Marcos, Rafael⁴; Sala, María²; Castells, Xavier²

¹Consorci Sanitari de l'Anoia, Igualada; ²Hospital del Mar, Barcelona; ³Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell; ⁴Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Resumen

Objetivos: Describir la incidencia y los factores asociados a las complicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer de mama en mujeres cribadas.

Métodos: La población de estudio son mujeres diagnosticadas de cáncer de mama entre los años 2000 y 2009, procedentes de 4 programas de cribado de Canarias y Cataluña. Se calculó la incidencia global de complicaciones, y se comparó la incidencia de complicaciones según las características de los tumores, de las mujeres y de los tratamientos realizados. El riesgo de complicaciones se estimó con el odds ratio (OR) mediante modelos de regresión logística univariados y multivariados.

Resultados: La incidencia global de complicaciones fue del 29,4%. Entre las complicaciones, la más frecuente fue el dolor (37,6%), el linfedema (35,1%), la ansiedad (33,2%), la fatiga (24,1%) y la discapacidad funcional del brazo o de la pared torácica (18,2%). Se observó una mayor incidencia de complicaciones en las mujeres con tumores de estadios más avanzados (IIIb: 45,0%), de mayor tamaño (T4: 41,2%), con afectación ganglionar positiva (41,1%), y tumores infiltrantes (32,4%) ($p = 0,05$). La incidencia de complicaciones fue mayor en las mujeres que presentaban otras comorbilidades (38,3%), en las que se realizó linfadenectomía (38,2%) y en aquellas que recibieron quimioterapia post-cirugía (37,2%) ($p = 0,005$). En el análisis multivariado, los factores asociados a la presencia de complicaciones fueron tener otras comorbilidades (OR: 1,896 Intervalo de confianza (IC) 95%: 1,334-2,694), haberse realizado linfadenectomía (OR: 2,777, IC95%: 1,912-4,033) y recibir quimioterapia post-cirugía (OR: 1,771, IC95%: 1,209-2,596).

Conclusiones: La incidencia de complicaciones en mujeres diagnosticadas a través de los programas poblacionales de detección precoz fue relativamente alta. La aparición de complicaciones está más relacionada con los tratamientos recibidos y con la presencia de otras comorbilidades que con las características del tumor.