

Cirugía Española



www.elsevier.es/cirugia

V-044 - ABORDAJE TATA PARA RESOLUCIÓN DE PERITONITIS SECUNDARIA A DEHISCENCIA DE SUTURA RECTAL

González Díaz, Selene; García Romera, Ángel; Soto Darias, Iván Carmelo; Montes, Alberto; Arteaga González, Iván Jesús; Díaz Luis, Hermógenes; Carrillo Pallarés, Ángel

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna.

Resumen

Objetivos: Demostrar mediante un vídeo que la cirugía transanal endoscópica puede ser una herramienta útil en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones de la cirugía colo-rectal.

Métodos: Presentamos un vídeo en el cual se realiza lavado laparoscópico de colecciones más cierre de dehiscencia de sutura rectal vía transanal endoscópica (TAMIs), en un paciente varón intervenido de neoplasia rectal (RAR laparoscópica con anastomosis mediante CEEA 31 mm a 8 cm + ileostomía) en cuyo postoperatorio presenta dehiscencia de sutura manifiesta mediante datos de infección sin sepsis.

Resultados: El paciente evoluciona favorablemente tras la reparación transanal y el lavado laparoscópico. Es dado de alta 20 días tras la reintervención.

Conclusiones: La cirugía transanal endoscópica es una herramienta útil, que debemos considerar entre nuestro arsenal diagnóstico-terapéutico durante las complicaciones de la cirugía colo-rectal.