



La imagen del mes

Bazo errante en paciente asintomática

Wandering spleen in an asymptomatic patient

Juan Pérez Legaz*, Rafael Ferrer Riquelme, Luis Juárez Palomo y Rafael Calpena Rico

Servicio de Cirugía, Hospital General Universitario de Elche, Alicante, España



Figura 1

Mujer de 30 años a la que en una ecografía ginecológica de rutina se diagnostica de masa pélvica. Se completa el estudio con una tomografía computarizada abdominal, en la que cranealmente a la vejiga se identifica una masa homogénea, con vasos que penetran en ésta a través de un hilio vascular, compatible con bazo errante, y se visualiza el pedículo vascular que desciende desde el hipocondrio izquierdo (fig. 1). Una vez diagnosticado, el tratamiento debe ser quirúrgico para prevenir complicaciones; éstas se han descrito en el 65% de los casos no tratados quirúrgicamente, por lo que se realiza una esplenectomía laparoscópica.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: juanperezlegaz@hotmail.com (J. Pérez Legaz).
0009-739X/\$ - see front matter © 2009 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.ciresp.2009.05.019