



Imagen del mes

Evisceración transvaginal como complicación de la cirugía del suelo pélvico

Transvaginal evisceration as a complication of pelvic floor surgery

René Borges Sandrino *, Enia Ramón Musibay y Cemerami Rodríguez Ley

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital General Docente Dr. Carlos J. Finlay, Cuba



Figura 1



Figura 2

Paciente de 63 años con antecedentes de histerectomía total abdominal hacía un año que presentó prolapso de cúpula vaginal que se reparó por técnica de William-Richardson.

Acude al servicio de Urgencia con dolor abdominal, vómitos y hemorragia vaginal de seis horas de evolución. Al examen físico se observa intestino delgado (íleon terminal y colon derecho) que protruye a través de la vagina (figs. 1 y 2).

Se realiza laparotomía de urgencia encontrándose isquemia del intestino prolapsado realizándose hemicolectomía derecha con colocación de malla de polipropileno en el suelo pélvico. La paciente evoluciona satisfactoriamente siendo dada de alta a los diez días de la intervención

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: eborges@infomed.sld.cu (R. Borges Sandrino).

0009-739X/\$ – see front matter © 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2010.06.015