

La imagen del mes

Pseudoaneurisma de la arteria mesentérica superior en paciente cirrótico: tratamiento mediante radiología intervencionista

Superior mesenteric artery pseudoaneurysm in a cirrhotic patient: interventional radiologic management

Raquel García-Roca *, Santiago Sánchez Cabús y Josep Fuster

Institut de Malalties Digestives i Metabòliques, Cirurgia Hepatobiliar y Trasplantes, Hospital Clinic Barcelona, Barcelona, España




Figura 1

Paciente de 48 años con cirrosis enólica Child-Pugh B, complicada con hemorragia digestiva alta, ascitis y encefalopatía hepática. Consulta por dolor abdominal sin fiebre, paracentesis compatible con peritonitis bacteriana espontánea evolucionando a shock séptico a pesar del tratamiento. El TAC abdominal identifica como hallazgo incidental un pseudoaneurisma de la arteria mesentérica superior de 8 x 6 cm parcialmente trombosado, con riesgo de rotura (fig. 1). Se realiza arteriografía y colocación de stent cubierto expandible con balón de 5 x 22 mm, consiguiendo la exclusión completa del mismo y manteniendo permeabilidad distal. No presenta signos de isquemia intestinal post-stent, sin embargo fallece a consecuencia del shock séptico.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: raqgar@hotmail.com (R. García-Roca).

0009-739X/\$ – see front matter © 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2010.07.022