

**Carta al Director****Tratamiento laparoscópico de un orificio herniario en el ligamento ancho****Laparoscopic treatment of a hernial orifice in the broad ligament**

Sr. Director:

Hemos leído con mucho interés la comunicación sobre la oclusión intestinal por hernia interna a través del ligamento ancho, que han presentado como imagen del mes los cirujanos del Hospital Doctor Peset de Valencia en Cir Esp. 2012;90.e5.

Felicitamos a este grupo de cirujanos por el éxito del tratamiento, en especial, por la sospecha diagnóstica precoz, que consiguió un tratamiento quirúrgico sin necesidad de resección intestinal. Sin embargo, aunque la ooforosalpingectomía ha sido también comunicada por otros grupos, en especial cuando es imposible la reducción herniaria¹, quisieramos señalar, que existe otra opción, con menor coste, de tratamiento laparoscópico del orificio herniario, al mismo tiempo que se evitaría la resección de los anejos. Esto podría conseguirse con una sutura continua de los bordes del orificio herniario².

Véase contenido relacionado en DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2011.02.013>

B I B L I O G R A F Í A

1. Onida S, Lynes K, Ozdemir BA, Whitehouse PA. Unexpected findings at diagnostic laparoscopy: caecal incarceration with concurrent appendicitis in a patient with bilateral broad ligament defects. Ann R Coll Surg Engl. 2010;92:W19–20.
2. Garcia-Oria M, Inglada J, Domingo J, Biescas J, Ching C. Small bowel obstruction due to broad ligament hernia successfully treated by laparoscopy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007;17:666–8.

Miguel Garcia-Oria*

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla, Madrid, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mgarse4@oc.mde.es

0009-739X/\$ – see front matter

© 2012 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2012.03.007>