

La imagen del mes

Fractura crónica de hueso hioides

Chronic hyoid fracture



Karla Liseth Leonher Ruezga^{a,*}, Luis Ricardo Ramírez Gonzalez^a y
Lucio Flavio Ávila Silva^b

^a Servicio de Cirugía General, Hospital Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco, México

^b Servicio de Anestesiología, Hospital Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco, México



Figura 1




Figura 2

Varón de 18 años que acude a Urgencias por persistencia de disfagia, disfonía y deformidad en cuello 3 meses después de caída de caballo y contusión cervical sobre una piedra. Solicitamos radiografías donde se aprecia fractura del hueso hioides (fig. 1). Realizamos resección del cuerpo del hueso hioides sin complicaciones (fig. 2A y B). A un mes del evento quirúrgico se observa mejoría de deglución y fonación.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: karlaleonher@gmail.com (K.L. Leonher Ruezga).

0009-739X/\$ – see front matter © 2013 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2013.09.005>