



La imagen del mes

Extracción de un cuchillo ingerido impactado en el esófago mediante endoscopia flexible



Removal of an ingested knife impacted in the esophagus using flexible endoscopy

Vicente Olivares Ripoll*, Víctor López López, Eloisa Amate Tortosa y Elena Gil Gómez

Departamento de Cirugía General, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, España




Figura 1

Mujer de 43 años, que acude a urgencias tras la ingesta voluntaria de un cuchillo.

Entre sus antecedentes destaca un trastorno límite de personalidad con múltiples intentos de suicidio y artrodesis lumbar. La exploración física fue normal. Se efectuó una radiología simple de tórax (fig. 1A) que permitió observar un cuchillo situado a nivel del tercio inferior del esófago yuxta cardial, sin evidencia de neumotórax, neumomediastino ni neumoperitoneo. Se decidió la exploración bajo anestesia general, extrayendo el cuchillo, que media 22 cm, con la ayuda de un sobretubo endoscópico (fig. 1B)

La endoscopia flexible bajo anestesia general y con supervisión de cirugía es una herramienta que se ha de tener en cuenta para la extracción de cuerpos extraños intestinales.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: vicenteolivaresripoll@gmail.com (V. Olivares Ripoll).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.11.003>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.