



La imagen del mes

Torsión de lóbulo hepático de Riedel simulando apendicitis aguda



Torsion of Riedel's hepatic lobe simulating acute appendicitis

María Pilar Iskra Marco *, Ángel Gallego Vila, Claudio Silva Vergara y Joan Sancho Insenser

Departamento de Cirugía General, Hospital del Mar, Barcelona, España



Figura 1

Varón de 18 años con dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen y anorexia de 48 h de evolución, con defensa y rebote en fosa ilíaca derecha. La analítica sanguínea reveló leucocitosis de $14.000 \times 10^9/l$ y PCR de 0,2 mg/dl. La ecografía mostró un apéndice subhepático en contacto con una masa de 2×2 cm dependiente del hígado. Mediante laparoscopia se evidenció un apéndice hiperémico en contacto con una masa pedunculada de 5×4 cm, necrótica, dependiendo del segmento V hepático compatible con lóbulo hepático de Riedel torsionado (fig. 1), por lo que se realizó la hepatectomía del lóbulo y la apendicectomía.

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: mpilariskra@gmail.com, pim17_9@hotmail.com (M.P. Iskra Marco).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.02.001>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.